

انواع آلرژی های مربوط به دندانپزشکی

آلرژی های مربوط به دندانپزشکی یکی از مشکلاتی است که باعث می شود افراد بسیاری از مراجعه به دندانپزشک ترس داشته باشند. در این مقاله با بررسی حساسیت به مواد دندانپزشکی شما متوجه خواهید شد که آیا جز افرادی هستید که آلرژی به مواد دندانپزشکی دارند یا خیر.



به لبخند شما زندگی هیبخشیم
تلفن تماس: ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ و یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹
Baran Dental Clinic
کلینیک دندان پزشکی بارانا

کلینیک دندانپزشکی بارانا؛ ارائه دهنده انواع خدمات زیبایی و درمانی دندان

آلرژی های مربوط به دندانپزشکی چیست؟

آلرژی و حساسیت به مواد دندانپزشکی یا هر ماده دیگری، به معنی واکنش بیش از حد و غیرعادی سیستم ایمنی بدن به مواد بی ضرر است. وقتی شما به چیزی حساسیت دارید، یعنی سیستم ایمنی بدن شما بسیار حساس است و نسبت به ورود آن ماده خاص به بدن ری اکشن نشان می دهد. تقریباً تمام افراد به یک ماده آلرژی دارند، برخی از افراد به مواد دندانپزشکی، برخی دیگر به گردو خاک، برخی به مواد غذایی خاص و... این مقاله به آلرژی های مربوط به دندانپزشکی خواهد پرداخت.



انواع

آلرژی در دندانپزشکی

انواع مختلف آلرژی های مربوط به دندانپزشکی

مراجعه به دندانپزشک برای بسیاری از افراد به دلیل حساسیت به مواد پرکننده دندان با ترس همراه است. همین امر سبب می شود تا رفتن به دندانپزشکی تا حد امکان به تعویق افتد. این افراد ممکن است در حین حضور در دندانپزشکی یک واکنش آلرژیک را تجربه کنند. آلرژی به لاتکس، حساسیت به روکش دندان، حساسیت به لیدوکائین در دندانپزشکی، حساسیت به دندان مصنوعی و **بریچ دندان** برخی از شایع ترین این حساسیت ها است. در ادامه به برخی از مهم ترین انواع آلرژی در دندان پزشکی اشاره خواهیم کرد:

حساسیت به بی حسی موضعی

حساسیت به داروی بی حسی موضعی یکی از رایج ترین آلرژی های مربوط به دندانپزشکی است که اغلب به دلیل یک آلرژی واقعی نیستند. علائمی که پس از استفاده از بی حس کننده موضعی رخ می دهد، ممکن است ناشی از اضطراب و عوارض جانبی اپی نفرین یا همان آدرنالین باشد. اپی نفرین اغلب به بی حس کننده های موضعی اضافه می شود تا اثر بی حسی طولانی تر باقی بماند. علاوه بر این نگهدارنده های ترکیبی با بی حس کننده های موضعی مانند متیل پارابن هم ممکن است در این واکنش ها دخیل باشند. از عوارض آمپول بی حسی دندان می توان به تپش قلب اشاره کرد. در نظر داشته باشید که حساسیت به مواد **کامپوزیت دندان** هم می تواند برای برخی از افراد اتفاق افتد. سرفه کردن، خارش پوست دست، کاهش فشار خون، مشکلات خفیف تنفسی، کهیر، تورم در چشم ها از دیگر علائم حساسیت به آمپول بی حسی دندانپزشکی است.



کلینیک دندان پزشکی بارانا
09157609009
Baranadental.com

درماتیت چشمی یکی از علائم حساسیت به آمپول بی حسی دندانپزشکی است



کهیر پوستی از عوارض تزریق مواد بی حسی در دندانپزشکی است

در چنین شرایطی دندانپزشک برای درمان حساسیت به آمپول بی حسی دندانپزشکی از لیدوکائین استفاده می‌کند. در موارد نادر افراد به لیدوکائین هم آلرژی دارند که جایگزین لیدوکائین در دندانپزشکی، سایر مواد بی حسی با اثرات کمتر است.



لیدوکائین جایگزین مواد بی حس کننده در دندانپزشکی است

حساسیت به لاتکس

از دیگر آلرژی های مربوط به دندانپزشکی، حساسیت به لاتکس است. بسیاری از محصولات پلاستیکی از لاتکس ساخته می شود که معمولاً در محصولات بهداشتی مانند دستکش معاینه لاتکس استفاده می شود. برخی از افراد ممکن است به لاتکس حساسیت داشته باشند که قرار گرفتن در معرض آن منجر به واکنش های آلرژیک مانند کهیر، خارش در محل تماس، گرفتگی گلو، خس خس سینه، تهوع، مشکل در تنفس و آنافیلاکسی می شود. چنین واکنش آلرژیکی ممکن است هنگام مراجعه به دندانپزشکی که از دستکش معاینه لاتکس استفاده می کند، رخ دهد.



حساسیت به لاتکس یکی از آلرژی های مربوط به دندانپزشکی است

درماتیت تماسی

مواد شیمیایی زیادی در مطب دندانپزشکی استفاده می شوند که می توانند باعث درماتیت تماسی اطراف دهان و همچنین تحریک لثه شوند. برای اطلاعات بیشتر در زمینه لثه و بیماری های مرتبط آن، می توانید مقاله [انواع جراحی لثه](#) را مطالعه کنید. ترکیبات موجود در آمالگام دندان (از جمله جیوه)، باندینگ می تواند منجر به قرمزی، تورم و تحریک لثه ها شود. علاوه بر این، طعم دهنده های موجود در دهان شویه ها و خمیر دندان ها هم می توانند باعث تحریک داخل دهان یا پوست اطراف لب شوند. تعدادی از آلرژی های مربوط به دندانپزشکی وجود دارند که قرار گرفتن در معرض آن ها ممکن است منجر به واکنش هایی در اطراف دهان یا لب ها شود. این عوارض این نوع از حساسیت شامل تاول پوست، پوسته پوسته شدن آن، ایجاد جوش قرمز، خارش شدید و تورم اطراف دهان است.



درماتیت تماسی اطراف دهان نوعی آلرژی مرتبط با دندانپزشکی محسوب می‌شود

چگونه می‌توان آلرژی‌های مربوط به دندانپزشکی را کاهش داد؟

بیماران ممکن است فقط به حساسیت‌های دارویی خود توجه کنند و متوجه نباشند که انواع دیگر آلرژی‌ها باید در هنگام مراجعه به دندانپزشکی و پر کردن فرم‌های تاریخچه پزشکی خود اطلاع‌رسانی کنند. قبل از شروع یک قرار ملاقات، دندانپزشک شما ممکن است از شما بپرسد که آیا تا به حال به هر ماده‌ای واکنش آلرژیک داشته‌اید یا خیر. اگر دارید، دندانپزشک شما ممکن است بپرسد که واکنش آلرژیک چه بوده است. این نوع سوالات به دندانپزشک شما کمک می‌کند تا مطمئن شود که مواد و روش‌های دندانپزشکی مورد استفاده در طول درمان برای شما بی‌خطر است. برای یک تجربه ایمن در زمینه دندانپزشکی لازم است به دندان‌پزشک خود موارد زیر را اطلاع دهید:

1. داروها، غذاها و موادی که می‌شناسید یا فکر می‌کنید به آنها حساسیت دارید
2. سابقه قبلی واکنش‌های آلرژیک به داروهای بی‌هوشی و سایر داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها
3. اطلاع به دندانپزشک در صورتی که در گذشته دچار آنافیلاکسی (افت ناگهانی فشار خون) شده‌اید

کلام پایانی

آلرژی‌های مربوط به دندانپزشکی بسیار متنوع هستند، برخی از افراد دچار بثورات پوستی می‌شوند، درحالی‌که برخی دیگر مشکلات تنفسی را تجربه می‌کنند. در صورت مواجهه با یک نوع از آلرژی ممکن است در آینده شما را در معرض خطر بیشتری

برای مصرف همان دارو یا ماده قرار دهد. ارائه یک لیست کامل از آلرژی‌ها و واکنش‌های گذشته می‌تواند به تیم دندانپزشکی شما کمک کند تا از ایمنی شما در طول درمان اطمینان حاصل کنند.

خدمات زیبایی و درمانی در مشهد؛ کلینیک دندانپزشکی بارانا

"**کلینیک بارانا** با مجهزترین تجهیزات دندانپزشکی در مشهد امکان انجام انواع خدمات زیبایی و درمانی را برای شما عزیزان فراهم کرده است. اگر مادر هستید و نگران‌هایی از بابت سلامت دندان خود دارید، با ما آن را در میان بگذارید. بر این باوریم که مادران بیش از همه، لیاقت لبخند زدن را دارند. ما سخت کار میکنیم تا مطمئن بشیم شما بیشتر میخندید. برای مشاوره رایگان از کارشناسان ما با اطمینان خاطر کمک بخواهید." شماره‌های تماس **09157609009** - **05137609009**: ساعات پاسخگویی:

9 الی 14 و 17 الی 20



کلینیک بارانا؛ ارائه دهنده تمامی خدمات دندانپزشکی زیبایی و درمانی در مشهد

سوالات متداول

آیا آمپول بی حسی دندان باعث گلودرد میشود؟

خیر، به طور معمول این نوع از آمپول منجر به گلودرد نمی‌شود. اگر شما حساسیت به آمپول بی حسی دندان را داشته باشید یا مقداری از مواد بی حسی بر اثر اشتباه دندانپزشک در دهان شما ریخته شود، ممکن است احساس گلودرد داشته باشید.

گوش درد بعد از پر کردن دندان ارتباطی با آلرژی‌های مربوط به دندانپزشکی دارد؟

خیر، گوش درد گرفتن با آلرژی های رایج در دندانپزشکی چندان مرتبط نیست و بیشتر به این درد زمانی ظاهر می شود که فرد پیش یا پس از درمان همچنان دچار عفونت شدید دندانی باشد آنقدر که به نواحی فک و گوش و بینی هم برسد.

آیا حساسیت به دندان مصنوعی جز آلرژی های مربوط به دندانپزشکی است؟

بستگی دارد این حساسیت چگونه بروز کند، اگر این حساسیت با قرمزی و تورم است، باید چک شود، در غیر این صورت اگر با درد فک همراه است، می توان گفت در ماه های اول طبیعی است؛ چراکه جسم خارجی وارد دهان شده است و تا زمانی که بدن و بافت لثه ها به آن عادت کند، زمان خواهد برد.