

## علت باقی ماندن ریشه دندان شیری در لثه بزرگسالان

زمانی که دندان شیری کشیده می شود، ریشه آن هم جدا می شود و در لثه نمی ماند، اما ماندن آن در بزرگسالی هم امکان پذیر است. باقی ماندن ریشه دندان شیری همانطور که برای قرارگیری دندان های کودکان می تواند دردسرساز شود، برای بزرگسالان هم می تواند مشکل ساز شود. این مقاله توضیح می دهد که چگونه یک فرد می تواند تشخیص دهد که هنوز ریشه دندان شیری در دهان دارد یا خیر.

### مشاوره بر اساس طرح لبخند

ارسال طرح لبخند از طریق چت سایت و دریافت مشاوره


تلفن تماس: ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹-۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹



با ارسال تصویر از طرح لبخند خود می توانید مشاوره رایگان دریافت نمایید.

### دندان های شیری چگونه رشد می کنند؟

دندان های شیری معمولاً حدود 6 ماهگی شروع به رویش می کنند. این دندان ها هم برخلاف تصور برخی ریشه دارند و باتوجه به نوع آن تا 30 ماهگی ظاهر می شوند. هنگامی که کودک به سن 5 تا 6 سالگی می رسد، دندان های دائمی آن ها به سطح لثه نزدیک تر و ریشه دندان های شیری متلاشی و در نهایت باعث شل شدن و افتادن آن ها می شود.



ترتیب رشد دندان های شیری

در سن 12 تا 14 سالگی اکثر افراد تمام دندان های شیری خود را از دست می دهند و 28 دندان در بزرگسالانی دارند. چهار دندان آخر، یعنی دندان عقل، معمولاً آخرین دندان هایی هستند که در سنین 17 تا 21 سالگی ظاهر می شوند.

در برخی موارد ممکن است فرد سنین افتادن دندان شیری را گذرانده باشد، اما همچنان ریشه دندان شیری در دهان او باقی مانده باشد که به آن دندان های شیری ماندگار هم می گویند

حدود 25٪ از افراد دارای دندان های شیری بیشتر از سن مورد انتظار برای از دست دادن آنها هستند و با مشکل ماندن ریشه دندان شیری در لثه دست و پنجه نرم می کنند. دندان های شیری در بزرگسالان می توانند سال ها در دهان فرد دوام بیاورند. با این حال ممکن است به مرور زمان غیر کاربردی هم شوند. اگر شما هم احساس می کنید هنوز یادگار کودکی خود، دندان شیری را در دهان دارید با مراجعه به دندانپزشکی می توانید از این مسئله مطمئن شوید. تشخیص دندانپزشکان [کلینیک دندانپزشکی بارانا](http://Baranadental.com) در این زمینه می تواند به شما کمک بسیاری کند. در ویدیوی زیر ترتیب در آمدن دندان شیری را می بینید:

چگونه می توان تشخیص داد که فردی بزرگسال هنوز دندان شیری دارد؟

**ماندن ریشه دندان شیری** می تواند برای دندان های دائمی فرد مشکل ایجاد کند. واضح ترین تفاوت بین دندان های دائمی و شیری اندازه آنهاست. دندان های شیری کوچکتر از دندان های دائمی هستند. معمولا دندان های شیری سفیدتر هستند، زیرا مینای نازکتری نسبت به دندان های دائمی دارند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص دندان شیری می توانید به مقاله [دندانپزشکی کودکان مشهد](#) مراجعه کنید.

دندان های شیری عموماً لبه های صاف و گردتری دارند. هنگامی که دندان های دائمی شروع به رویش می کنند، برجستگی های مشخصی در لبه های بالایی ایجاد می شوند. همین برجستگی ها کمک می کند تا دندان های دائمی از طریق لثه بیرون بیایند. البته به مرور زمان این برجستگی ها در دندان دائمی از بین می روند.

### **علت باقی ماندن ریشه دندان شیری در بزرگسالی چیست؟**

شایع ترین علت جا ماندن ریشه دندان شیری در لثه در بزرگسالان نبود جانشین دائمی برای آن ها است. اگر فردی دندان دائمی آماده رویش و جایگزینی دندان شیری نداشته باشد، احتمال اینکه آن دندان شیری را تا بزرگسالی حفظ کند، بیشتر خواهد بود.

در این شرایط معمولا دندان های جایگزینی که از دست می دهند، دندان های پرمولر دوم فک پایین هستند که در پشت دهان قرار دارند که در اصطلاح پزشکی به این بیماری "آژنزی دندان" می گویند.



شکاف بین دندان



کلینیک دندان پزشکی بارانا  
09157609009

Baranadental.com



بیماری آژنزی سبب می شود تا دندان های دائمی به درستی و کامل رشد نکنند

بیماری آژنزی در زنان شایع تر از مردان است و برخی از افراد ممکن است این عارضه را از طریق ژن های خود به ارث ببرند که دارای سه بخش است:

1. هیپودنتیا: (Hypodontia) پنج دندان یا کمتر رشد نمی کنند
2. الیگودنتیا: (Oligodontia) بیش از پنج دندان رشد نمی کنند
3. آنودنتیا: (Anodontia) مجموعه کاملی از دندان ها رشد نمی کنند

از دیگر موارد علت ماندن ریشه دندان شیری در لثه بزرگسالان رویش نابجا است. این مسئله زمانی اتفاق می افتد که بیرون زدن ریشه دندان شیری از لثه پیش آید.

در واقع دندان از طریق لثه بیرون می زند و مسیر معمول خود را دنبال نمی کند. دندان های شیری در بزرگسالان نیز می تواند در اثر نهفتگی دندان جانشین ایجاد شود. در این حالت دندان بیشتر از وضعیت نرمال در بافت یا استخوان لثه فرو می رود و بیرون نمی آید. در نظر داشته باشید که ماندن ریشه دندان شیری جلو بیشتر از سایر دندان ها اتفاق می افتد .



ماندن دندان شیری در دهان سبب می شود تا دندان دائمی فضای مناسبی برای رویش پیدا نکند

### نحوه ترمیم دندان های شیری در بزرگسالان

اگر فردی بالغ هنوز دندان شیری دارد و دندان های جانشین آن از بین رفته باشد، می تواند دندان های شیری را با انجام برخی از اصلاحات نگه دارد و از آن استفاده کند. این ترمیم ها و اصلاحات می تواند شامل اضافه کردن یک کلاه قالبی به بالای دندان شیری باشد که ظاهر یک دندان دائمی را به آن بدهد. این کار باعث می شود تا تحلیل ریشه دندان ریشه به راحتی اتفاق نیفتد.

اگر یک دندانپزشک متخصص دندان شیری را خارج کند، فرد ممکن است یکی از راه حل های زیر را انتخاب کند:

1. استفاده از فضا نگهدار ارتودنسی
2. استفاده از روش های ارتودنسی برای بستن شکافی که قبلا دندان شیری قرار داشت
3. استفاده از درمان جایگزین کردن دندان مصنوعی در فضایی که زمانی دندان شیری در آن قسمت قرار داشت



فضانگه دار ارتودنسی مانع جابجایی و کج شدن دندان های مجاور می شود





ارتودنسی؛ از درمان های موثر برای حذف فاصله بین دندان ها

### برای مشکل ریشه دندان شیری چه زمانی باید به دندانپزشک مراجعه کرد؟

اگر یک بزرگسال دندان شیری دارد، باید به دندانپزشکی مراجعه کند. دندانپزشک دندان را ارزیابی می کند و تصمیم می گیرد که آیا درمان لازم است یا خیر. اگر دندان سالم باشد، ممکن است دندانپزشک توصیه کند که دندان شیری را در جای خود نگه دارد.

برای جلوگیری از عوارض باقی ماندن ریشه دندان شیری در لثه ممکن است دندانپزشک تصمیم بگیرد که برخی از اقدامات ارتودنسی را روی دندان های اطراف فرد انجام دهد. اگرچه [بهترین سن ارتودنسی دندان](#) سنین نوجوانی در نظر گرفته می شود، اما انجام آن در هر وقت دیگر خالی از لطف نخواهد بود. در برخی شرایط هم دندانپزشک به فرد توصیه می کند تا دندان شیری را خارج کند؛ بنابراین تجویز دندانپزشک تا حد زیادی به شرایط دهان هر فرد متفاوت خواهد بود.



در اکثر موارد کشیدن دندان شیری در بزرگسالان امری ضروری تلقی می شود

**سوالات دندانانی خود را از کلینیک دندانپزشکی بارانا بپرسید**

اگر ریشه دندان شیری در لثه بماند، دندانپزشک ممکن است فرد را به یک متخصص ارتودنسی یا متخصص پروتز ارجاع دهد که بتواند مشاوره های تخصصی را ارائه دهد.

“کلینیک دندانپزشکی بارانا با ارائه انواع خدمات دندانپزشکی زیبایی و درمانی می تواند به شما این اطمینان را بدهد که وجود هر نوع ریشه دندان شیری یا دندان اضافه را به واسطه همکاری با بهترین دندانپزشکان برایتان تشخیص دهد. همین تخصص و تبحر و هماهنگی با پرسنل مجموعه است که سلامت دهان و دندان شما را تضمین می کند.” شماره های تماس کلینیک [09157609009](tel:09157609009) – [05137609009](tel:05137609009) : ساعات پاسخگویی: 9

الی 13 و 16 الی 21





در کلینیک دندانپزشکی بارانا بر این باوریم که همه لیاقت لبخند زیبا را دارند

## سوالات متداول

### 1. آیا ریشه دندان شیری را باید کشید؟

زمانی که شما کودک خود را برای کشیدن دندان به دندانپزشکی می برید یا خود آن دندان لق می شود و می افتد، در کنار تاج دندان، ریشه آن هم کشیده می شود؛ بنابراین نیازی نیست به صورت مجزا برای کشیدن ریشه دندان شیری در کودکی اقدام کرد.

### 2. آیا دندان شیری ریشه دارد؟

بله، دندان شیری هم مانند دندان های دائمی ریشه دارند. در واقع دندانی زنده است که پالپ داشته باشد و ریشه دندان هم در قسمت پالپ قرار دارد.

### 3. عوارض باقی ماندن ریشه دندان شیری چیست؟

در خردسالی ماندن ریشه دندان شیری نمی تواند عوارضی را به همراه داشته باشد، اما باقی ماندن ریشه دندان شیری در بزرگسالی می تواند دندان های دائمی را با مشکلاتی همراه کند و نظم و ترتیب رویش آن ها را از حالت نرمال خارج کند یا باعث شود که به درستی رشد نکنند.