خواندن این مقاله قبل از ایمپلنت برای دیابتی ها واجب است!

یکی از پرتکرارترین سوالات در حوزه دندانپزشکی این است که آیا **افراد دیابتی می توانند ایمپلنت کنند؟** جواب این سوال به **میزان قند خون برای ایمپلنت** بستگی دارد. کسانی که قند خون‌شان **کنترل نشده** باشد، ابتدا باید آن را کنترل و سپس برای کاشت دندان اقدام کنند. خبر خوب این که اگر دیابت کنترل شده دارید، می‌توانید ایمپلنت دندان انجام دهید اما بشرطها و شروطها!

در این مقاله قصد داریم نکات مهمی از جمله **روش‌های کاشت دندان** و **مراقبت از ایمپلنت برای افراد دیابتی** را بررسی کنیم تا در طولانی مدت دچار مشکل نشوید .



برای رزرو نوبت و تعیین وقت مشاوره رایگان روی بنر کلیک کنید.

چرا ایمپلنت برای دیابتی ها مشکل ساز می شود؟

بیشتر اوقات **دیابت و ایمپلنت** مانند کارد و پنیر هستند و آبشان با هم در یک جوی نمی‌رود اما علت این ناسازگاری چیست؟ همانطور که گفتیم، تنها **افرادی که قند خون کنترل نشده دارند،** نمی‌توانند ایمپلنت دندان انجام دهند. این در حالی است که افراد مبتلا به دیابت کنترل شده برای کاشت دندان با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

خوب است بدانید که **ناسازگاری ایمپلنت و بیماری قند خون** در این افراد سه عامل مهم دارد که در ادامه هر کدام را به طور جداگانه توضیح می‌دهیم:

۱) نوروپاتی دیابتی یا بی‌حسی موضعی

قند خون کنترل نشده یکی از موانع ایمپلنت برای افراد دیابتی است چرا که به اعصاب صدمه می‌زند و در نهایت منجر به بی‌حس شدن ناحیه موردنظر می‌شود. وقتی فرد از آسیب وارده آگاه نباشد، نمی‌تواند به موقع برای درمان اقدام کند، در نتیجه زخم پیشرفت کرده و درمانِ آن، دشوار یا غیرممکن می‌شود. اگر فردی به »**نوروپاتی دیابتی** «مبتلا باشد و در حین پروسه یا حتی بعد از کاشت دندان دچار آسیب شود، ممکن است عوارضی جدی گریبان او را بگیرد.




«نوروپاتی» عوارض بعد از ایمپلنت برای افراد دیابتی را افزایش می‌دهد.

۲) کند شدن جریان خون و روند بهبودی زخم

یکی دیگر از تاثیرات دیابت کنترل نشده بر بدن، **کاهش جریان خون** است. وقتی جریان خون کند شود، زخم مواد مغذی لازم برای بهبود را دیرتر دریافت کرده و جراحات حاصل از **ایمپلنت برای افراد دیابتی** تشدید می‌شود .

۳) اختلال در عملکرد گلبول‌های سفید به دنبال افزایش گلوگز خون

گلبول‌های سفید نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کنند. هنگامی که سطح گلوکز خون به طور مداوم بالا باشد، عملکرد این گلبول‌ها مختل شده و قادر به مبارزه با باکتری‌ها و ترمیم زخم نخواهند بود. این مسئله می‌تواند یکی از عوامل عفونت یا عدم ترمیم زخم‌های حاصل از **ایمپلنت برای افراد دیابتی** باشد .



دیابت باعث کاهش گلبول‌های سفید خون و طولانی شدن روند بهبود زخم می‌شود.

روش های کاشت ایمپلنت برای افراد دیابتی

دندانپزشکان برای کاهش **عوارض ایمپلنت در افراد دیابتی**، از روش‌های مختلفی برای کاشت دندان استفاده می‌کنند که در ادامه مطلب آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

۱. ایمپلنت برای افراد دیابتی به روش All on ٤

اگر بیمار دیابتی احتیاج به یک ردیف کامل ایمپلنت در فک بالا یا پایین داشته باشد، بهترین روش **«All on ٤»**است. در این روش یک ردیف دندان تنها به وسیله چهار پیچ روی فک بالا یا پایین قرار می‌گیرند در نتیجه نیازی به پیوند استخوان نیست .
با توجه به این که روند بهبود زخم‌ها در بیماران مبتلا به قند خون طولانی‌تر از افراد عادی است، استفاده از این روشِ ایمپلنت برای افراد دیابتی گزینه کم‌خطرتری خواهد بود .



این روش، بهترین نوع ایمپلنت برای افراد دیابتی است.

برای اطلاع از قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین یا **قیمت ایمپلنت all on ٤** می‌توانید با مشاوران «**کلینیک دندانپزشکی بارانا**» به شماره ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ یا ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

۲. مینی ایمپلنت برای دیابتی‌ها

یکی از انواع ایمپلنت برای بیماران دیابتی «**مینی ایمپلنت دندان**» است. در این روش علاوه بر این که هزینه‌ها و مدت زمان کاشت دندان کوتاه‌تر است، عوارض آن هم نسبت به کاشت دندان با روش معمولی کمتر است. همچنین برای **کاشت مینی ایمپلنت**، نیازی به پیوند استخوان نخواهید داشت. برخی از دندانپزشکان این روش را توصیه نمی‌کنند چرا که بایستی دندان ایمپلنت شده را به طور مداوم تعمیر و یا تعویض کنید و این احتمال عفونت را در افراد دیابتی بالا می‌برد.



مینی ایمپلنت برای افراد دیابتی راهکار خوبی است.

۳. ایمپلنت فوری

سومین روشی که می‌توان از آن برای **ایمپلنت در افراد دیابتی** استفاده کرد، روش کاشت فوری یا یک روزه دندان است. برای انجام این روش بایستی فک، **تراکم استخوان کافی** داشته باشد. اغلب اوقات دندانپزشکان از این روش برای پر کردن جای خالی دندان‌های جلویی استفاده می‌کنند و بعد از گذشت چند ماه، آن را با **ایمپلنت دائم** تعویض می‌کنند.



سومین روش ایمپلنت برای افراد دیابتی، کاشت دندان یک روزه است.

۴. بریج دندان

چهارمین و آخرین روش برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته در افراد دیابتی، **بریج دندان** است. البته لازم است بدانید که این روش دائمی نیست و طول عمر آن در مقایسه با ایمپلنت، کوتاه‌تر است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت بریج دندان در مشهد، با **کلینیک بارانا** تماس حاصل فرمایید.



بریج دندان در مقایسه با ایمپلنت دوام کمتری دارد.

مراقبت های قبل از کاشت ایمپلنت برای افراد دیابتی

زمانی که قند خون کنترل شده باشد، اختلالی در عملکرد سیستم ایمنی بدن ایجاد نمی‌شود. خوشبختانه با رعایت چند نکته ساده و در عین حال مهم می‌توانید از طریق کنترل قند خون، ریسک **ایمپلنت برای افراد دیابتی** را کاهش دهید.
این نکات عبارتند از:

۱. حتماً مدتی قبل از موعد جراحی، با یک **متخصص تغذیه** مشورت کنید تا موارد لازم در خصوص کنترل قند خون را برایتان تجویز کند.
۲. در صورت مصرف **انسولین**، پیرامون دُز مصرف آن در شب قبل و روز جراحی با دندانپشک خود مشورت کنید .
۳. دندانپزشک را از داروهای مصرفی خود آگاه کنید تا در صورت نیاز برای تعویض آن‌ها، شما را به **متخصص دیابت** ارجاع دهد.
٤. ۴۸ساعت قبل از جراحی، از مصرف **داروهای کنترل‌کننده گلوکز خون** بپرهیزید.



حتماً

درباره داروهای مصرفی و دُز آن‌ها، با دندانپزشک مشورت کنید.

مراقبت های بعد از کاشت ایمپلنت برای افراد دیابتی

- بهداشت ناحیه ایمپلنت شده را به خوبی رعایت کنید.
- در طول درمان **رژیم غذایی سالم و بدون قند** داشته باشید .
- برای بررسی وضعیت سلامت و عدم عفونت ایمپلنت، به طور مرتب به دندانپزشک مراجعه کنید.
- از خوردن خوراکی‌هایی مانند **آجیل** و **ته‌دیگ** که احتمال آسیب رساندن به محل زخم را دارند، بپرهیزید .
- **بهبود زخمِ ایمپلنت در افراد دیابتی طولانی‌تر خواهد بود**؛ پس صبوری کنید و این انتظار را داشته باشید که زخمتان دیرتر از حد معمول التیام یابد.
- میزان قند خونتان را مرتب چک کنید چرا که ممکن است به دلایلی مانند استرس، درد و غیره دائماً تغییر کند .



بعد از ایمپلنت، به طور مرتب میزان قند خون خود را چک کنید.

دریافت مشاوره و کاشت ایمپلنت برای افراد دیابتی

«**کلینیک بارانا**» یکی از بهترین و معتبرترین مراکز دندانپزشکی مشهد است. خبر خوب این که در این مرکز، ایمپلنت دندان در مشهد به صورت **اقساطی** انجام می‌شود. جهت دریافت مشاوره در زمینه انجام **ایمپلنت برای افراد دیابتی** با شماره‌های ۳۷۶۰۹۰۰۹-۰۵۱ و ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

سوالات متداول در زمینه دیابت و ایمپلنت دندان

۱. مهم‌ترین علت شکست ایمپلنت در افراد دیابتی چیست؟

طولانی بودن دوران بهبود زخم و **احتمال بالا برای عفونت**، از مهم‌ترین عوامل شکست ایمپلنت در افراد مبتلا به قند خون هستند .

۲. جوش خوردن ایمپلنت برای افراد مبتلا به قند خون چقدر با افراد عادی متفاوت است؟

جوش خوردن ایمپلنت در افراد دیابتی بین **۱۰ تا ۱۲ هفته** طول می‌کشد؛ در حالی که این بازه در کسانی که مبتلا به بیماری قند خون نیستند، بین ۶ تا ۸ هفته است.

۳. آیا افراد دیابتی می‌توانند کاشت دندان با لیزر انجام دهند؟

به صورت کلی لیزر باعث افزایش خون‌رسانی شده و احتمال ابتلا به عفونت را کاهش می‌دهد در نتیجه روش خوبی برای **ایمپلنت در افراد دیابتی** است.