ایمپلنت دندان یک روش درمانی موثر برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته است. اما این درمان هم مانند سایر درمان ها، با عوارضی همراه است که عفونت ایمپلنت یکی از شایع‌ترین آن ها است. این عفونت معمولاً در نتیجه تجمع باکتری ایجاد می‌شود. اگر به تازگی ایمپلنت انجام داده اید و نگران عفونت کردن آن هستید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

چرا ایمپلنت دندان عفونت می کند؟

علت عفونت ایمپلنت برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد اما مواردی که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم از شایع ترین علل بروز عفونت در ایمپلنت دندان هستند.

1. **عدم رعایت بهداشت دهان و دندان :**مسواک زدن به صورت نامنظم و عدم استفاده از نخ دندان، منجر به تجمع پلاک و جرم در اطراف ایمپلنت دندان می‌شود. این پلاک و جرم می‌توانند محل مناسبی برای رشد باکتری‌ها و در نتیجه عفونی شدن ایمپلنت باشند.
2. **استعمال دخانیات :**خشکی دهان و کاهش جریان خون در لثه ها از عوارض سیگار کشیدن است که باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت نیز می شود.
3. **ضعف سیستم ایمنی بدن :**ضعف سیستم ایمنی بدن که معمولا ناشی از بیماری هایی مثل سرطان و دیابت است می‌تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد) **.در اکثر موارد برای این بیماران، ایمپلنت دندان انجام نمی‌شود(**
4. **جایگذاری نادرست ایمپلنت :**این اتفاق که به دلیل بی تجربگی و عدم مهارت کافی دندانپزشک رخ میدهد، احتمال عفونت ایمپلنت را افزایش میدهد چون ممکن است باعث ایجاد زخم یا پارگی در لثه‌ها شود و زخم ها بستر مناسبی برای بروز عفونت هستند.
5. **حساسیت به پیچ ایمپلنت :**برای کاهش احتمال حساسیت به ایمپلنت، پیچ آن از جنس تیتانیوم ساخته شده اما در موارد نادر، ممکن است بدن فرد به ایمپلنت دندان آلرژی داشته باشد. این آلرژی می‌تواند منجر به التهاب و عفونت در اطراف ایمپلنت شود.



تجمع باکتری در اطراف ایمپلنت باعث عفونت آن می‌شود.

5نشانه ای که به هیچ عنوان نباید نادیده بگیرید!

اگر کاشت دندان به روش ایمپلنت انجام داده اید و دچار علائم زیر هستید فوراً آن را با متخصص ایمپلنت خود در میان بگذارید.

- **•درد و ناراحتی در اطراف ایمپلنت** :اولین علامتی که باید جدی بگیرید Tدرد در ناحیه ایمپلنت است. البته درد ایمپلنت تا چند روز اولیه پس از کاشت طبیعی است اما بعد از آن، حتما موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید. این درد ممکن است خفیف، شدید و ثابت یا متناوب باشد.
- **•بوی بد دهان** :بوی بد دهان ممکن است ناشی از تجمع باکتری‌ها در اطراف ایمپلنت باشد.
- **•قرمزی، تورم یا التهاب لثه در ناحیه ایمپلنت**
- **•خونریزی یا خروج چرک از اطراف ایمپلنت**
- **•تب**



خروج چرک ناحیه ایمپلنت و تب از نشانه های عفونت شدید ایمپلنت دندان هستند.

درمان سریع عفونت ایمپلنت از بروز عوارض جدی جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد یک باکتری کوچک مشکلات بزرگ برایتان ایجاد کند! در ادامه مهم ترین عوارض ایمپلنت دندان را توضیح می‌دهیم.

عوارض ایمپلنت عفونی

اگر عفونت درمان نشود، می تواند منجر به **از دست رفتن ایمپلنت** شود. این امر به دلیل سرایت عفونت به استخوان فک اتفاق می‌افتد. اما این تنها مشکل نیست! عفونت ایمپلنت میتواند به سایر قسمت های بدن مانند گوش، خون و قلب نیز راه پیدا کند و عوارض جدی و جبران ناپذیری به وجود آورد.

راه های درمان ایمپلنت عفونی

درمان ایمپلنت عفونی، به شدت عفونت بستگی دارد. در موارد خفیف، با آنتی بیوتیک درمان می شود اما در موارد شدیدتر، ممکن است نیاز به جراحی برای برداشتن ایمپلنت و بافت آلوده باشد.

1- درمان عفونت ایمپلنت دندان با آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک‌ها می‌توانند به از بین بردن باکتری‌های مضر دهان کمک کنند. نوع و دوز مناسب آنتی بیوتیک برای عفونت ایمپلنت باید توسط متخصص برای شما تجویز شود.



آنتی

بیوتیک مناسب شما، توسط دندانپزشک یا جراح فک و صورت تجویز می شود.

2- درمان خانگی عفونت

درمان خانگی برای عفونت ایمپلنت وجود ندارد. این یک عارضه جدی است که باید توسط دندانپزشک درمان شود. درمان خانگی ممکن است باعث بدتر شدن عفونت شود و خطر عوارض جدی را افزایش دهد.

3- درمان عفونت ایمپلنت دندان با جراحی

اگر میزان عفونت شدید باشد باید برای برداشتن ایمپلنت و بافت آلوده جراحی انجام شود. بعد از گذراندن دوره نقاهت جراحی ایمپلنت عفونی، ممکن است بتوانید مجدداً ایمپلنت دندان انجام دهید. این کار معمولاً چند ماه پس از جراحی انجام می شود.



پس

از جراحی، ممکن است نیاز به مصرف آنتی بیوتیک‌ها برای جلوگیری از عفونت مجدد باشد

پیشگیری از عفونت ایمپلنت با رعایت چند راهکار ساده

ایمپلنت دندان نیز، مانند یک دندان طبیعی، به مراقبت نیاز دارد. اگر بهداشت دهان و دندان خود را به خوبی رعایت نکنید، ممکن است دچار عفونت شوید.


برای *پیشگیری از عفونت ایمپلنت دندان*، نکات زیر را رعایت کنید:

- دو بار در روز مسواک بزنید و یک بار در روز نخ دندان بکشید. این کار باعث از بین رفتن پلاک و جرم بین دندان ها می‌شود. از مسواک زدن مستقیم روی ایمپلنت خودداری کنید. این کار می‌تواند به پایه ایمپلنت آسیب برساند.
- از دهان شویه ضد عفونی کننده برای از بین بردن باکتری های مضر دهان استفاده کنید.
- استعمال دخانیات ممنوع
- به طور منظم برای چکاپ ایمپلنت به دندانپزشک مراجعه کنید. دندانپزشک می تواند ایمپلنت شما را بررسی کند و هرگونه مشکل احتمالی را زودهنگام تشخیص دهد.

نکته مهم :در نظر داشته باشید چنانچه خدمات دندانپزشکی از جمله **ایمپلنت دندان در مشهد** یا سایر شهر ها، زیر نظر متخصص با تجربه انجام شود احتمال بروز عوارض احتمالی و عفونت به صفر می‌رسد.

بارانا؛ کلینیک دندانپزشکی با تیم متخصص و تجهیزات مدرن

کلینیک دندانپزشکی بارانا یکی از معتبرترین کلینیک‌های دندانپزشکی در مشهد است. این کلینیک با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته و تیمی از دندانپزشکان متخصص، خدمات دندانپزشکی با کیفیتی را به بیماران ارائه می‌دهد. "کلینیک بارانا در زمینه کاشت ایمپلنت دندان نیز تجربه و تخصص بالایی دارد. این کلینیک از ایمپلنت‌های دندانی با کیفیت بالا استفاده می‌کند و فرایند کاشت را با دقت و مهارت بالا انجام می‌دهد به همین دلیل احتمال بروز عفونت ایمپلنت یا سایر عوارض این چنینی در این مرکز برای مراجعین گرامی به حداقل می‌رسد".



کلینیک بارانا ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی در مشهد؛ با کیفیت بالا و قیمتی مناسب

سوالات متداول

4- ممکن است عفونت ایمپلنت دندان قبل از قرار دادن روکش اتفاق بیفتد؟

بله- امکان عفونی شدن ایمپلنت از زمان قرار گرفتن پیچ داخل استخوان فک وجود دارد. باکتری ها می توانند در اطراف ایمپلنت تجمع کنند، حتی اگر هنوز روکش روی آن قرار نگرفته باشد.

5- آیا عفونت ایمپلنت می تواند باعث از دست رفتن دندان طبیعی شود؟

بله – بی توجهی به ایمپلنت عفونی باعث آسیب به استخوان فک می‌شود و این اتفاق علاوه بر از دست رفتن ایمپلنت منجر به لق و شل شدن دندان طبیعی و از دست رفتن آن نیز خواهد شد.

6- امکان عفونی شدن ایمپلنت چند سال بعد از نصب آن وجود دارد؟

بله – عفونت ایمپلنت دندان می تواند بعد از چند سال شروع شود. این به این دلیل است که باکتری ها می توانند در اطراف ایمپلنت تجمع کنند، حتی اگر در ابتدا عفونی نباشد. با رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان میتوانید از این اتفاق جلوگیری کنید