تاثیرات مخرب فشار خون بالا در دندانپزشکی

بیشتر افراد مبتلا به فشار خون بالا به دلیل علائم مخفی آن از وجود این بیماری در خود بی اطلاع هستند. فشار خون بالا در دندانپزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. پزشک با بررسی فشار خون می تواند به اطلاعات مهمی در مورد بیمار دست پیدا کند و خدمات درمانی را با احتیاط بیشتر و تحت شرایط کنترل شده انجام دهد. در ادامه به بررسی فشار خون بالا در دندانپزشکی و تاثیر آن بر ایمپلنت و کشیدن دندان می پردازیم.



برای رزرو نوبت و تعیین وقت مشاوره رایگان روی بنر کلیک کنید.

آیا دارو های بی حسی بر فشار خون تاثیر دارند؟

از بی حسی های موضعی برای نواحی اطراف دندان و لثه در بیشتر خدمات دندان پزشکی استفاده می‌شود. بیشتر این آمپول ها حاوی «اپی نفرین» هستند. اپی نفرین با بیحسی های موضعی، ترکیب و سرعت جذب ماده بی حسی را کاهش و باعث اثرگذاری طولانی مدت بر روی لثه می‌شود. این ماده در مواجهه با شرایط اضطراری به عنوان مکانیزم دفاعی به طور طبیعی در بدن همه افراد ترشح می شود. با ترشح اپی نفرین، فشار خون افزایش می یابد و بدن در برابر استرس از خود دفاع می کند. زمانی که پزشک از آمپول بی حسی یا یک پماد موضعی حاوی اپی نفرین استفاده می کند؛ امکان افزایش فشار خون در بیمار وجود دارد. به همین دلیل اطلاع پزشک از فشار خون بالا در دندانپزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه امروزه محدودیتی برای مصرف داروهای منقبض کننده عروق و این بیحسی ها وجود ندارد، اما احتمال تحریک و افزایش فشار خون بعد از تزریق را نباید فراموش کرد. با اطلاع از وجود فشار خون بالا در دندانپزشکی، می توان با مصرف دوز مجاز 04/0 میلی گرم از این ماده یا بی حسی های موضعی بدون اپی نفرین و تجویز دارو، از بروز مشکلات جدی پیشگیری کرد.



داروهای بیحسی حاوی اپی نفرین باعث افزایش فشار خون می شوند.

فشار خون بالا در دندانپزشکی و انجام ایمپلنت

امروزه ایمپلنت به یک روش محبوب برای ترمیم دندان های از دست رفته تبدیل شده است. به تازگی دندانپزشکان قبل از انجام هرگونه خدمات دندانپزشکی مانند ایمپلنت، ترمیم پوسیدگی و انجام لمینت؛ فشار خون بیمار را بررسی و سوابق پزشکی او را جویا می شوند. ترس از دندانپزشکی و جراحی، فشار خون را افزایش می دهد. انجام ایمپلنت دندان در مشهد نیز به جراحی هایی نیاز دارد که فشار خون عملکرد آن را مختل می‌کند. فشار خون بالا در دندانپزشکی و مصرف برخی دارو ها، جریان خون در اطراف بافت های دهان و دندان را کاهش می دهد و سبب بروز التهاب در اطراف ایمپلنت می شود. خشکی دهان ناشی از مصرف داروها نیز فضای دهان را برای بروز عفونت آماده می کند. فشار خون بالا مانع از کاشت ایمپلنت نمی‌شود؛ اما باید قبل از انجام آن، وضعیت را با پزشک خود در میان بگذارید. پزشک با کنترل شرایط بهترین گزینه درمانی را برای شما انتخاب می کند.



فشار خون بالا باعث التهاب در اطراف ایمپلنت می شود.

تاثیرفشار خون بالا در دندانپزشکی بر بهداشت دهان و دندان

وجود فشار خون بالا در دندانپزشکی انجام برخی خدمات درمانی مانند پر کردن و کشیدن دندان را با مشکل مواجهه می کند. مصرف دارو های فشار خون نیز باعث به خطر افتادن سلامت دهان و دندان می شود. پوسیدگی دندان یکی از رایج ترین عوارض مصرف دارو های فشار خون است. مصرف این دارو ها باعث خشکی دهان و کاهش ترشح بزاق می شود. با کاهش بزاق، آنزیم های مختلفی که باعث تخریب باکتری های دهان می شوند نیز کاهش می یابد. تجمع این باکتری ها باعث تخریب مینای دندان و پوسیدگی می شود. در صورت مصرف این دارو ها، حتما با پزشک خود مشورت کنید تا با مصرف فلوراید به صورت دهان شویه و ژل موضعی اثر آن را کاهش دهید.

رابطه کشیدن دندان و فشار خون بالا در دندانپزشکی

یکی از خدمات درمانی که در افراد با فشار خون بالا در دندانپزشکی انجام نمی شود، کشیدن دندان است. به طور معمول کشیدن دندان در بیمارانی با فشار خون بالاتر از حد مجاز 80/120 با خونریزی شدید تری همراه است. در صورت بالا بودن فشار، حتما باید با مصرف دارو و مراقبت های پزشکی آن را کاهش داده، سپس اقدام به کشیدن دندان ها کنید. اقدام به درمان در صورت کنترل نکردن فشار، خطر التهاب لثه، تخریب و لق شدن دندان های کناری را بیشتر می کند. همچنین خونریزی زیاد احتمال حمله قلبی و سکته را نیز افزایش می دهد.



فشار خون بالا در دندانپزشکی باعث شدت خونریزی می شود.

تداخلات داروی های فشارخون با داروهای دندانپزشکی

برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکل در فشار خون بالا در دندانپزشکی و خدمات درمانی، پزشک باید تداخلات داروهای تجویز شده جهت درمان عفونت و کنترل درد را در نظر بگیرد. مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، تاثیر داروهای فشار خون را کاهش می دهد. البته مصرف این دارو ها در بازه زمانی کوتاه مدت از اهمیت کمی برخوردار است.



مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، تاثیر داروهای فشار خون را کاهش می دهد.

کلینیک بارانا؛ ارائه دهنده خدمات برتر دندانپزشکی

اکنون که از اهمیت فشار خون بالا در دندانپزشکی اطلاع پیدا کردید؛ می دانید که حتما باید قبل از انجام هرگونه اقدامات درمانی شرایط و داروهای مصرفی خود را با پزشک مطرح کنید تا پزشک بتواند با تحت کنترل گرفتن شرایط، کم خطر ترین درمان را برای شما انتخاب کند.

کلینیک دندانپزشکی بارانا با داشتن کادری مجرب از بهترین متخصصین، آماده ارائه خدماتی ایمن و مطمئن به شما عزیزان است. برای رزو وقت و مشاوره رایگان می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید 09157609009 :یا 05137609009

سوالات متداول در مورد فشار خون بالا در دندانپزشکی

.1آیا دندان درد باعث افزایش فشار خون می شود؟

بله! دندان درد می تواند باعث افزایش سطح اضطراب و استرس در فرد و بالا رفتن فشار خون شود. البته این عارضه موقتی بوده و مشکل فشار خون دائم را به همراه ندارد.

.2افراد دارای فشار خون بالا از چه نوع ایمپلنتی می توانند استفاده کنند؟

افراد دارای فشارخون بالا می‌توانند از هر دو روش ایمپلنت سنتی و فوری استفاده کنند. بعد از بررسی وضعیت آن ها، پزشک بهترین گزینه درمانی را پیشنهاد می دهد.

.3آیا استفاده از لیدوکائین بر فشار خون تاثیر دارد؟

استفاده از لیدوکائین چه به صورت تزریقی و چه به صورت استعمالی به دلیل وجود اپی نفرین، باعث بالا رفتن غیرطبیعی فشار خون و همچنین عوارض جانبی دیگر می شود.

.4میزان فشار خون مجاز برای انجام کارهای دندانپزشکی چقدر است؟

فشار خون بالا در دندانپزشکی میتواند مشکل ساز باشد. میزان فشار خون ۱۸۰ روی ۱۱۰ میلی‌متر جیوه برای انجام کارهای دندانپزشکی اورژانسی مجاز می‌باشد.