علت رشد دندان کوسه ای در کودکان چیست ؟ + راه های درمان

دندان کوسه ای (دو ردیف شدن دندان) یکی از متداول‌ترین مشکلات جایگزینی دندان شیری با دندان دائمی است که در کودکان رخ می‌دهد. در صورتی که جوانه‌های دندان دائمی زیر دندان شیری قرار نگیرد؛ باعث به وجود آمدن دو ردیف دندان یا دندان کوسه ای می‌شود. در این مطلب به طور مفصل به نحوه تشخیص، راه‌های درمان و دلایل به وجود آمدن این عارضه پرداخته ایم.

اصطلاح دندان کوسه ای یا دابل زمانی استفاده می‌شود که دندان شیری در جایگاه خود در لثه قرار دارد و دندان دائمی نیز پشت آن رشد می‌کند. در حدود 4 تا 6 سالگی دندان‌های دائمی زیر دندان‌های شیری رشد می‌کنند و باعث لق شدن آن‌ها می‌شوند. در صورتی که این اتفاق نیوفتد کودک همزماند ردیف دندان در قوس دهانی خواهد داشت. این عارضه در دندان‌های جلویی فک پایین شایع‌تر است؛ اما گاهی در فک بالا و دندان‌های آسیاب نیز رخ می‌دهد.



رشد دندان کوسه ای در فک پایین شایع‌تر است.

درمان دندان کوسه ای

هنگامی که این عارضه در فک پایین رخ می‌دهد باید به **دندانپزشکی کودکان در مشهد** مراجعه کرد. در صورتی که دندانپزشک متوجه لق بودن دندان‌های شیری شود درمان خاصی انجام نمی‌دهد. در این مواقع 2 تا 3 هفته زمان لازم است تا دندان لق به صورت طبیعی بیوفتد. اگر در زمان عنوان شده دندان نیوفتاد؛ باید اقدام به کشیدن آن کرد. با فشار زبان، دندان دائمی در جای اصلی خود قرار می‌گیرند.

اگر پس از کشیدن دندان شیری فضای کافی برای رشد دندان‌های دائمی وجود نداشته باشد؛ دندانپزشک از یک روش درمانی به نام دیسکینگ استفاده می‌کند. این روش فضای لازم برای رشد دندان‌های دائمی را ایجاد می‌کند. در این شیوه درمان، با تراش مقداری از مینای دندان‌های مجاور فضای کافی برای رشد به وجود می آید.
دندان کوسه ای در فک بالا مستلزم کشیدن دندان در اسرع وقت است. تاخیر در کشیدن دندان کوسه ای فک بالا نیز باعث نیاز به ارتودنسی در آینده می‌شود.



بروز دندان کوسه ای در فک بالا مستلزم کشیدن دندان است.

علت دندان کوسه ای چیست؟

رشد دندان دائمی پشت دندان شیری مسئله‌ای است که هنوز دلایل آن به صورت قطعی اثبات نشده است. دندانپزشکان بر این باور هستند که این عارضه به دلیل حل نشدن ریشه دندان شیری اتفاق می‌افتد. دندان‌های دائمی در فرایند رشد، ریشه دندان شیری را حل می‌کنند. کودک نیز با زبان زدن و دستگاری، این روند را تسریع می‌کند.

هنگامی که این پروسه سرعت کافی نداشته باشد، دندان دائمی جای دیگری را که مقاوت کمتری دارد برای رشد انتخاب می‌کند. برخی دیگر نیز دلیل دندان کوسه ای را ازدحام دندان‌های فک پایین یا یک انحراف ساده از حالت طبیعی می‌دانند.

عوارض رویش دندان دائمی پشت دندان شیری چیست؟

2ردیف شدن دندان‌ها در قوس دهانی می‌تواند مشکلاتی را برای کودک به وجود آورد. از بارزترین عوارض دندان کوسه ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.مشکلات گوارشی و تلفظی

دندان کوسه ای می‌تواند جویدن و هضم غذا را با مشکل مواجه کند. علاوه بر این در تلفظ صحیح برخی حروف نیز اثرگذار است.

2.ظاهر غیرطبیعی

وجود 2 ردیف دندان در دهان، ظاهری غیرطبیعی و نامنظم ایجاد می‌کند. این ناهنجاری می‌تواند بر اعتماد به نفس و زیبایی لبخند تاثیرگذار باشد.



دندان کوسه ای باعث ایجاد ظاهر غیرطبیعی در شکل دندان‌ها می‌شود.

3.ایجاد بیماری های دهان و دندان

وجود دندان کوسه ای می‌تواند باعث ایجاد التهاب یا عفونت در لثه‌ها شود. همچنین به دلیل عدم دسترسی درست به دندان‌ها در هنگام مسواک زدن، احتمال بروز پوسیدگی دندان افزایش می‌یابد.

4.تاثیر مقابل دندان ها بر هم در دندان کوسه ای

دندان‌های دائمی و موقتی که به صورت کوسه ای در کنار هم قرار گرفته‌اند بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. عدم فضای کافی برای رشد دندان‌های دائمی، ایجاد مشکلات موقتی یا همیشگی در ترتیب دندان‌های اصلی از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

معرفی بهترین دندانپزشکی کودکان مشهد

چنانچه دندان دائمی کودک شما پشت دندان شیری (دندان کوسه ای) شروع به رشد کرده؛ لازم است در اولین فرصت با یک دندانپزشک در این خصوص مشورت کنید. در صورت لق نبودن دندان شیری باید در اولین فرصت اقدام به کشیدن آن کرد. یکی از مزیت‌های **کلینیک دنداپزشکی بارانا**، بخش ویژه معاینه و درمان کودکان است. کلیه خدمات دندانپزشکی کودک در این مجموعه توسط بهترین دندانپزشکان انجام می‌شود. شما می توانید بدون نگرانی جهت درمان فرزندان دلبندتان به این مرکز مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و معاینه رایگان می‌توانید همه روزه به جز ایام تعطیل با شماره‌های
09157609009 – **05137609009**تماس حاصل کنید.


baranadental.com
09157609009