عصب کشی در بارداری

عصب کشی در بارداری یکی از نگرانی‌های رایج مادران به شمار می‌رود. در صورت نیاز به این درمان، بهترین زمان برای انجام آن ۳ ماه دوم بارداری است. در این بازه مادر و جنین در وضعیت نسبتا پایدارتری قرار دارند و با مشورت پزشک و رعایت احتیاط‌های لازم، مادران باردار می‌توانند عصب کشی انجام دهند.

قیمت عصب کشی دندان مشهد در کلینیک دندانپزشک بسته به میزان آسیب‌دیدگی دندان، تعداد کانال‌های ریشه و روش درمانی مورد استفاده بین بازه ن بازه ۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

عفونت دندان و عصب کشی دندان در بارداری

عفونت دندان در بارداری معمولاً درد شدید و ناخوشایندی را به همراه دارد که تحمل آن برای مادر و جنین توصیه نمی‌شود. در صورتی که پوسیدگی به بافت‌های عمیق دندان و عصب برسد، ضروری است که هرچه سریع‌تر برای درمان اقدام کنید .درمان ریشه یا عصب کشی در دوران بارداری با حذف بافت‌های آلوده و ترمیم دندان، نه‌تنها درد را تسکین می‌دهد، بلکه از آسیب بیشتر به دندان جلوگیری می‌کند. بنابراین در صورت بروز درد یا مشکل دندانی، سریعاً به دندانپزشک مراجعه کرده تا از بروز مشکلات جدی‌تری پیشگیری شود.

تاثیر بارداری بر دندان و عصب آن

مادران باردار به علت تغییرات هورمونی در این دوران، بیشتر مستعد ابتلا به عفونت هستند؛ همین امر می‌تواند مشکلات دندانی موجود را تشدید کند. حالت تهوع و استفراغ در ماه‌های اول بارداری موجب تماس اسید معده با دندان‌ها شده و فرسایش مینای دندان را به دنبال دارد. در این شرایط، هر بار بعد از استفراغ، بلافاصله دهان خود را با آب بشویید و پس از گذشت نیم ساعت، مسواک بزنید.



عصب کشی دندان در ماه های مختلف بارداری

بارداری، دوران حساسی است که توجه به سلامت دهان و دندان در آن، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در ادامه، زمان انجام عصب کشی را بر اساس ماه بارداری بررسی می‌کنیم:

سه‌ماهه اول: هفته ۱۲-۱

سه‌ماهه اول، مرحله حیاتی برای رشد جنین به شمار می‌آید و بدن مادر تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد. به همین دلیل اقدامات دندانپزشکی مانند عصب کشی دندان در ماه اول بارداری باید به حداقل برسند؛ اگرچه این به معنای عدم توجه به سلامت دندان نیست، اما بهتر است در این دوره، تنها معاینات و درمان‌های ضروری انجام شود.

سه‌ماهه دوم: هفته ۲۷-۱۳

عصب کشی در سه‌ماهه دوم بارداری، بهترین زمان محسوب می‌شود. در این دوره جنینِ در حال رشد کمتر تحت تأثیر شرایط خارج از رحم قرار گرفته و پزشکان برای برنامه‌ریزی درمان‌های دندانی آزادی عمل بیشتری دارند.

سه‌ماهه سوم: هفته‌های ۴۰-۲۸

در سه‌ماهه سوم، به دلیل بزرگ شدن شکم، درازکشیدن به پشت برای مادر دشوار و ناراحت‌کننده خواهد بود. به همین دلیل، در صورت نیاز به درمان دنداپزشکی، نیاز است تا آرامش مادر در نظر گرفته شود. استفاده از بالشتک‌های حمایتی به کاهش ناراحتی بیمار کمک می‌کند .

بهترین زمان عصب کشی دندان در دوران بارداری

بهترین زمان برای انجام عصب کشی در دوران بارداری، سه‌ماهه دوم است. در این مرحله، جنین به اندازه کافی رشد کرده و شرایط پایدارتری برای اقدامات دندانپزشکی فراهم می‌شود. این زمان به پزشکان این امکان را می‌دهد که با آرامش خاطر و دقت بیشتری نسبت به سلامت مادر و جنین اقدام کنند.



مهم ترین خطرات احتمالی عصب کشی در بارداری

آیا عصب کشی در بارداری بی‌خطر است؟ عصب کشی دندان در دوران بارداری گاهی ضروری خواهد بود. مهم‌ترین خطرات احتمالی عصب کشی دندان در بارداری به شرح زیر است:

۱ .مواجهه با اشعه ایکس

برای تعیین آسیب‌دیدگی دندان و برنامه‌ریزی جهت عصب کشی در بارداری، ممکن است نیاز به تصویربرداری با اشعه ایکس باشد. در دوران بارداری، به ویژه طی سه‌ماهه اول، نگرانی اصلی در مورد تأثیر تابش اشعه ایکس بر جنین است. هرچند این اشعه معمولاً خطر زیادی ندارد، اما توصیه می‌شود در هنگام تصویربرداری از روش‌های محافظتی مانند پیشبند حائل یا یقه حفاظتی استفاده کنید تا از هرگونه عوارض احتمالی جلوگیری به عمل آید.

۲ .بی‌حسی و مصرف داروها

انتخاب صحیح نوع و میزان داروی بی‌حسی در طول عصب کشی برای مادران باردار، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین مصرف برخی داروها افزایش فشارخون، ضربان قلب و مشکلات جدی برای جنین را به دنبال دارد.

۳ .استرس و اضطراب

خطر دیگر مرتبط با عصب کشی در بارداری، استرس و اضطراب ناشی از این فرایند خواهد بود. این اضطراب ممکن است بر سلامت مادر و جنین تأثیر بگذارد. پزشکان می‌توانند با ارائه راهکارهایی به کاهش این استرس کمک کنند .

عوارض عدم عصب کشی دندان در بارداری

عدم عصب‌کشی دندان در دوران بارداری عوارض جدی را برای سلامت مادر و جنین به همراه دارد. عفونت‌های خفیف به مرور زمان تشدید شده، به عصب دندان آسیب رسانده و منجر به درد و ناراحتی شدید خواهد شد. از سوی دیگر، هنگامی که عفونت به مرحله‌ای پیشرفته برسد، ممکن است نیاز به کشیدن دندان باشد. بنابراین، درمان به موقع و مؤثر عفونت‌های دندانی در دوران بارداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از عوارض احتمالی جدی‌تر جلوگیری شود.

راه های پیشگیری از نیاز به عصب کشی در دوران بارداری

- شستشوی دهان بعد از استفراغ؛
- رعایت بهداشت دهان به‌طور منظم؛
- کاهش مصرف نوشیدنی‌های اسیدی؛
- پیشگیری از مصرف زیاد شرینی‌جات؛
- مراجعه دوره‌ای به دندانپزشک برای چکاپ پیش از بارداری؛



کلینیک دندان پزشکی بارانا
Barana Dental Clinic

راه‌های پیشگیری از نیاز به عصب کشی در بارداری

- شستشوی دهان بعد از استفراغ
- رعایت بهداشت دهان به‌طور منظم
- کاهش مصرف نوشیدنی‌های اسیدی
- پیشگیری از مصرف زیاد شیرینی‌جات
- مراجعه دوره‌ای به دندانپزشک برای چکاپ پیش از بارداری

نتیجه گیری؛ آیا عصب کشی در بارداری ضرر دارد؟

عصب کشی در بارداری در صورت تشخیص پزشک الزامی است، زیرا وجود عفونت می‌تواند برای مادر و جنین عواقب خطرناکی داشته باشد. مادر باردار در صورت درد دندان، باید ابتدا با پزشک زنان خود مشورت کرده و پس از کسب اجازه، به دندانپزشک مراجعه کند. ارزیابی وضعیت دندان و لثه‌ها و انجام اقدامات لازم باید تحت نظر دندانپزشک صورت گیرد تا به سلامت مادر و جنین آسیب نرسد.

برای رزرو نوبت معاینه و مشاوره رایگان در کلینیک دندانپزشکی بارانا مشهد می‌توانید همه‌روزه، به‌جز ایام تعطیل، با شماره‌های ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.