عوارض پر کردن دندان چیست؟

عوارض پر کردن دندان در برخی موارد ناراحتی و مشکلاتی مانند حساسیت به سرما و گرما، درد موقت یا طولانی‌مدت و شکستگی مواد ترمیمی برای فرد ایجاد می‌کند. نوع مواد استفاده‌شده و شرایط دندان در میزان این عارضه‌ها تأثیرگذار است. توجه به این عوامل در تصمیم‌گیری برای ترمیم دندان اهمیت دارد.

قیمت ترمیم و پر کردن دندان با آمالگام و کامپوزیت در کلینیک دندانپزشک مشهد بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان متغیر خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره‌های ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

آیا درد و ناراحتی بعد از پرکردن دندان طبیعی است؟

حساسیت و ناراحتی به‌عنوان عوارض پر کردن دندان در مشهد امری طبیعی به شمار می‌رود، به‌ویژه در مواردی که ترمیم کردن دندان عمیق انجام شده باشد. این درد معمولاً با از بین رفتن بی‌حسی خود را نشان داده و ممکن است تا چند روز ادامه یابد؛ اما زمان دقیق بهبودی بسته به هر فرد متفاوت خواهد بود. با این حال، اگر درد شدید و مزمن بود یا به مرور بهبود نیافت، به دندانپزشک مراجعه کنید تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری شود.

پر کردن دندان چه عوارضی دارد؟

ترمیم دندان، به‌عنوان یکی از روش‌های متداول برای درمان دندان‌های پوسیده عوارضی هم به همراه دارد. در ادامه عوارض پر کردن دندان را بررسی می‌کنیم:

۱. عفونت

عفونت دندان یکی از مشکلات شایع است که به دنبال ترمیم نکردن صحیح دندان‌ها به وجود می‌آید. این نوع عفونت معمولاً در ناحیه زیر ترمیم دندان اتفاق می‌افتد، به‌ویژه در مواقعی که پوسیدگی به‌طور کامل از بین نرود.

باقی‌مانده‌ی پوســیدگی می‌تواند موجب عفونت پالپ دندان شــده و علائم دردناک نظیر آبســه دندان را به‌دنبال داشته باشد.

۲ .بروز درد

یکی از عوارض پر کردن دندان، بروز درد در اطراف دندان ترمیم‌شــده اســت. این درد اغلب به دلیل عدم تطابق دندان پرشــده با دندان‌های مجاور به وجود می‌آید. اگر دندان پرشــده بلندتر از حد معمول باشــد یا به درســتی هم‌تراز نشــده باشــد، فشــار اضــافی به بافت‌های اطراف وارد شــده که نتیجه آن احســاس درد در ناحیه مورد نظر است.

۳ .التهاب لثه

التهاب لثه یکی دیگر از عوارض پر کردن دندان اســت که به دلایل مختلفی ایجاد شــده و معمولاً در کمتر از ۲۴ ساعت بهبود می‌یابد. با این حال، در برخی موارد، این التهاب به دلیل گسترش پوسیدگی یا انتقال مواد پرکننده به زیر لثه بروز می‌کند و گاهی به التهاب مزمن تبدیل می‌شود.

۴ .حساسیت دندان

یکی از شایع‌ترین عوارض پر کردن دندان ها حساسیت به دمای سرد و گرم است. این حساسیت معمولاً در روزها و ساعات اولیه پس از درمان خود را نشان داده و به مرور زمان کاهش می‌یابد. توجه داشته باشید که این مشکل موقتی بوده، اما در برخی موارد ممکن است مدت بیشتری طول بکشد. برای جلوگیری از هرگونه مشکل جدی‌تر باید با دندانپزشک خود مشورت کنید .



۵ .شکستگی دندان

شکستن یا ترک خوردن دندان پرشده یکی از مشکلاتی است که می‌تواند پس از درمان پیش آید. دندان‌های پرشده به‌ویژه در برابر فشارهای مکانیکی مانند جویدن غذاهای سفت یا ضربات خارجی آسیب پذیرتر هستند. در صورتی که دندان پرشده به اندازه کافی مقاوم نباشد یا تحت فشار زیاد قرار گیرد، خطر شکستگی آن افزایش می‌یابد.

۶ .تغییر رنگ دندان

یکی دیگر از عوارض پر کردن دندان ها، تغییر رنگ آن‌هاست که با گذشت زمان رخ می‌دهد. این تغییر رنگ، معمولاً به دلیل تماس دندان پرشده با مواد غذایی و نوشیدنی‌های رنگی مانند قهوه یا چای اتفاق می‌افتد.

۷ .پوسیدگی دندان مجاور


پوسیدگی دندان مجاور یکی از عوارض پر کردن دندان است که به کیفیت ماده ترمیمی بستگی دارد، به ویژه زمانی که ماده ترمیمی با دندان‌های مجاور در تماس باشد. سطح صاف و نرم ماده ترمیمی از تجمع پلاک و مواد غذایی جلوگیری می‌کند، اما در صورتی که دندانپزشک تجربه کافی نداشته باشد، ممکن است سطح زبری در نواحی بین دندانی باقی بماند که باعث تجمع پلاک و در نهایت پوسیدگی دندان مجاور می‌شود.

۸ .آسیب به بافت های نرم حین گاز گرفتن مواد غذایی

آسیب به بافت‌های نرم دهان یکی از عوارض شایع پس از پر کردن دندان به شمار می‌رود. در طول درمان، معمولاً برای کاهش درد، از بی‌حسی موضعی استفاده می‌شود که اثرات آن تا ۲ ساعت در بافت نرم باقی می‌ماند. این بی‌حسی خطراتی برای بیماران ایجاد کند، زیرا فقدان حس در بافت اطراف دندان منجر به گاز گرفتن ناخواسته و آسیب‌دیدگی می‌شود.

عوارض کوتاه بودن دندان پر شده چیست؟

کوتاه بودن دندان پر شده می‌تواند مشکلاتی مانند دشواری در جویدن، درد در ناحیه فک و حتی آسیب به دندان‌های مجاور را به همراه داشته باشد. زمانی که دندان‌های بالا و پایین به‌درستی روی هم قرار نگیرند، فشار زیادی به لثه‌ها و مفصل فک وارد شده و احتمال سایش یا شکستگی دندان افزایش می‌یابد. این مشکل نه‌تنها عملکرد دهان و دندان را مختل می‌کند، بلکه باعث ناراحتی طولانی‌مدت می‌شود.



عوارض بلند بودن دندان پر شده چیست؟

یکی از رایج‌ترین مشـکلات بلند بودن دندان پر شـده، درد در هنگام جویدن به دلیل ناهماهنگی ارتفاع دندان با سایر دندان‌هاست. این وضعیت نه‌تنها باعث فشار نامتعادل روی فک می‌شود، بلکه احتمال شکستگی آن را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر تأثیر منفی بر کیفیت زندگی، ممکن است نیاز به درمان‌های اصلاحی بیشتری به وجود آید.

عوارض پر کردن دندان با کامپوزیت چیست؟

پر کردن دندان با کامپوزیت به‌عنوان یکی از روش‌های متداول ترمیم دندان، ممکن با عوارضـــی همراه باشـــد. عوارض پر کردن دندان با کامپوزیت به شرح زیر است:

- حساسیت دندانی نسبت به فشار و تغییرات دما در روزهای اول بعد از ترمیم؛
- تغییر رنگ کامپوزیت نسبت به دندان‌های طبیعی، به‌ویژه در دندان‌های جلویی؛
- خطر ترک‌خوردن و نفوذ میکروب و مواد غذایی به زیر لایه پرشده و در نهایت کاهش استحکام دندان؛
- نیاز به مراجعه به دندانپزشک برای درمان دوباره در مواردی که دندان ضعیف و سست شده؛



عوارض پر کردن دندان با آمالگام چیست؟

پر کردن دندان با آمالگام به‌عنوان یک روز مؤثر و اتقصادی برای ترمیم دندان‌های پوسیده، ممکن است عارضه‌ای هم به همراه داشته باشد. در ادامه به برخی از عوارض پر کردن دندان با آمالگام می‌پردازیم:

- حساسیت دندان به سرما، گرما و فشار که معمولاً با گذشت زمان کاهش می‌یابد.
- احتمال بروز واکنش‌های آلرژیک نادر شامل تورم، قرمزی و خارش در ناحیه دهان وجود دارد.

- تحریک ریه به دلیل بخار جیوه، که بسیار نادر است.

عوارض پر کردن دندان بدون عصب کشی چیست؟

اگر آسیب دندان سطحی باشد، پر کردن بدون عصب‌کشی از پیشرفت پوسیدگی جلوگیری می‌کند. در صورتی که پوسیدگی به عصب رسیده باشد، انجام این روش بدون درمان ریشه عوارضی را به دنبال دارد. در ادامه، برخی از عوارض رایج این روش بررسی شده است:

- درد و حساسیت دندان
- ترک خوردگی یا شکستگی دندان
- التهاب و عفونت لثه یا استخوان فک
- نیاز به درمان مجدد و عصب کشی دیر هنگام



راه های کاهش عوارض پر کردن دندان

۱. انتخاب دندانپزشک ماهر و با تجربه

۲. محدودیت در مصرف کربوهیدرات‌ها

۳. اجتناب از مصرف غذاهای خیلی سرد و گرم

٤. پر هیز از جویدن غذا با دندان پرشده در روزهای اول

٥. رعایت بهداشت دهان و دندان با مسواک و نخ دندان

٦. کاهش مصرف مواد غذایی رنگی به مدت ۲۴ ساعت

خلاصه مقاله عوارض پر کردن دندان

عوارض پر کردن دندان شامل حساسیت به دما، درد موقتی، تغییر رنگ دندان و حتی تجمع باکتری‌ها به شمار می‌رود. همچنین، در صورت انتخاب نادرست مواد پرکننده، تغییر رنگ دندان یا تجمع باکتری‌ها ممکن است رخ دهد. پرکردگی‌های ناصحیح نیز می‌توانند باعث ترک خوردن یا شل شدن دندان شوند. برای جلوگیری از این مشکلات، انتخاب دندان‌پزشک ماهر و رعایت مراقبت‌های لازم پس از درمان ضروری است.