همه چیز در مورد عصب کشی دندان کودکان (عصب کشی دندان شیری)

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

عصب کشی دندان کودکان زمانی انجام می‌شود که پوسیدگی به عصب برسد. این درمان باعث حفظ دندان شیری تا زمان افتادن طبیعی آن و جلوگیری از مشکلاتی مانند نامرتبی دندان‌های دائمی و نیاز به ارتودنسی، اختلال در جویدن و تکلم، کاهش اعتمادبه‌نفس و گسترش عفونت می‌شود.



آیا دندان شیری هم عصب دارد؟

بله، ساختار دندان‌های شیری مانند دندان‌های دائمی از سه لایه تشکیل شده‌است:

۱. **مینا :**لایه سخت و بیرونی دندان
۲. **عاج :**لایه حساس زیر مینا
۳. **پالپ :**بخش داخلی دندان شامل عصب‌ها و رگ‌های خونی

به‌همین دلیل، وقتی دندان شیری پوسیده شده یا آسیب ببیند، کودک درد را احساس خواهد کرد.



بخش های مختلف دندان شیری

اهمیت عصب کشی دندان کودکان

عصب کشی دندان شیری کودک زمانی انجام می‌شود که پوسیدگی یا عفونت شدید به پالپ دندان برسد. این درمان علاوه بر جلوگیری از گسترش عفونت، کمک می‌کند دندان تا زمان طبیعی افتادن در جای خود باقی بماند و فضای لازم برای رویش دندان دائمی حفظ شود. از دست دادن زودهنگام دندان شیری می‌تواند باعث نامرتبی دندان‌های دائمی و نیاز به ارتودنسی در آینده شود. همچنین، سلامت دندان‌های شیری بر تغذیه، رشد، صحبت کردن و حتی اعتمادبه‌نفس کودک تأثیر مستقیم خواهدداشت. بنابراین درمان به موقع و جدی‌گرفتن عصب‌کشی دندان کودکان اهمیت زیادی دارد.

علائم به عصب رسیدن دندان کودکان

۱. تشکیل آبسه دندانی
۲. عفونت دندان شیری
۳. حساسیت دندان به گرما و سرما
٤. قرمزی و تورم اطراف دندان
٥. احساس درد هنگام لمس دندان
٦. پوسیدگی دندان
۷. شکستگی دندان



علائم نیاز به عصب کشی دندان کودک

در صورت مواجهه با هر یک از موارد گفته شده به دندانپزشکی کودکان در مشهد مراجعه کنید.

مراحل عصب کشی دندان کودکان (طریقه عصب کشی دندان کودکان)

۱. **معاینه و تشخیص بالینی :**بررسی علائم و تهیه عکس رادیوگرافی
۲. **حذف درد :**تزریق بی حسی موضعی
۳. **ایزولاسیون دندان :**جدا کردن دندان از بزاق و آلودگی (با رابردم یا پنبه) برای حفظ محیط استریل حین درمان
٤. **برداشتن پوسیدگی :**حذف بافت پوسیده و باز کردن راه ورود به حفره عصبی
٥. **خارج کردن پالپ آسیب‌دیده :**خارج کردن عصب تاج و ترمیم دندان در صورت محدود بودن التهاب به تاج و تخلیه عصب ریشه در صورت پیشروی پوسیدگی
٦. **شست‌وشوی کانال‌ها :**پاکسازی و نابودی میکروب‌های داخل کانال دندان با محلول‌های ضدعفونی‌کننده
۷. **روکش دندان عصب کشی شده :**پرکردن داخل ریشه و تاج دندان با خمیرهای مخصوص و در نهایت، روکش کردن دندان

مراقبت های بعد از عصب کشی کودکان

۱. بعد از عصب کشی دندان های شیری کودکان ، مصرف غذاهای نرم و پرهیز از غذاهای سفت، شیرین یا چسبناک توصیه می‌شود.
۲. بهتر است کودک از سمت دیگر دهان برای غذا خوردن استفاده کند.

۳. شستشوی دهان با آب‌نمک به کاهش درد و تورم کمک می‌کند.
٤. دندان‌ها را به آرامی حداقل دو بار در روز مسواک بزنند.
٥. استفاده از نخ دندان فراموش نشود.
٦. مراقب باشید کودک به لب و دهان خود آسیبی وارد نکند؛ مخصوصاً وقتی بی‌حس است.
۷. از فشار دادن یا ضربه زدن به دندان‌ها جلوگیری شود.
۸. حساس شدن و درد بعد از عصب کشی دندان کودک ، طبیعی است؛ در صورت نیاز، دندانپزشک، داروی ضد التهاب یا مسکن تجویز می‌کند.
۹. برای بررسی وضعیت دندان‌ها و اطمینان از سلامت آن‌ها، مراجعه منظم به دندانپزشک ضروری است.



کاهش درد و تورم بعد از عصب کشی دندان های شیری

انواع عصب کشی دندان کودک

عصب کشی دندان کودکان به روش های مختلفی انجام می‌شود که برای هر کودک، بسته به شرایط دندان و تشخیص دندانپزشک، متفاوت است. انواع روش‌های عصب کشی در کودکان عبارتند از:

۱ .عصب‌کشی جزئی (پالپوتومی)

بعد از برداشتن بخش کرونال (قسمت بالایی) عصب دندان، بخش باقی‌مانده با مواد ضدعفونی‌کننده پوشانده شده و برای حفظ استحکام و عملکرد، دندان روکش می‌شود.

۲ .عصب‌کشی کامل (پالپکتومی)

این نوع عصب کشی کودک ، تهاجمی‌تر بوده و مناسب التهابات شدید است؛ به این صورت که بعد از حذف تمام بافت عصبی، دندان روکش می‌شود.

عصب کشی دندان کودک چقدر طول میکشد ؟

تعداد جلسات عصب کشی دندان در کودکان به وضعیت دندان و تشخیص دندانپزشک بستگی دارد. اغلب اوقات، این درمان در یک جلسه انجام شود؛ اما در صورت گستردگی التهاب یا پیچیدگی شرایط دندان، ممکن است نیاز به چند جلسه باشد. در واقع، تشخیص تعداد جلسات پس از بررسی عکس رادیوگرافی و وضعیت دندان کودک توسط متخصص دندانپزشکی کودکان انجام می‌شود.



فرق عصب کشی دندان دائمی کودکان با دندان شیری

عصب‌کشی دندان‌های شیری و دائمی کودکان با هم یکسان نیستند؛ در ادامه به مقایسه این دو حالت پرداخته‌ایم.

عصب‌کشی دندان شیری

- **هدف :**نگهداری از دندان تا رویش دندان دائمی
- **روش درمان :**استفاده از پالپوتومی (برداشتن بخش تاج پالپ) و در صورت گسترش عفونت به ریشه، پالپکتومی (برداشتن کامل پالپ)
- **مواد پرکننده :**استفاده از مواد قابل جذب برای پیشگیری از اختلال در روند افتادن طبیعی دندان

عصب‌کشی دندان دائمی کودکان

- **هدف :**حفظ دندان برای همیشه
- **روش درمان :**حذف کامل پالپ عفونی از تاج و ریشه دندان
- **مواد پرکننده :**به‌کارگیری مواد دائمی و غیرقابل جذب

مضرات عصب کشی دندان کودکان

۱. تغییر رنگ دندان‌ها

۲. احتقان سینوسی به دلیل نزدیکی ریشه دندان به سینوس‌ها
۳. عفونت مجدد ریشه در صورت باقی ماندن عفونت در کانال‌ها
٤. ترک خوردن یا ضعیف شدن دندان پس از درمان
٥. درد و ناراحتی بعد از عصب‌کشی
٦. بروز تب پس از درمان
۷. عوارض ناشی از داروهای بیهوشی و بی‌حسی مانند بی‌حسی فک و مشکل در حرف زدن یا غذا خوردن
۸. تپش قلب و رعشه در برخی کودکان
۹. التهاب یا تیرگی دندان به دلیل استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده

خلاصه مقاله عصب کشی دندان شیری

عصب کشی دندان شیری در کودکان ، درمانی حیاتی برای حفظ سلامت دهان، رویش صحیح دندان‌های دائمی و جلوگیری از مشکلات آینده مثل بی‌نظمی دندان‌ها و نیاز به ارتودنسی است. در صورت مشاهده علائمی مانند درد، تورم، آبسه یا پوسیدگی دندان باید سریعاً کودک خود را نزد متخصص اطفال ببرید. معاینه به‌موقع و درمان صحیح باعث می‌شود دندان شیری تا زمان طبیعی افتادن در دهان باقی بماند

برای رزرو نوبت معاینه و مشاوره رایگان در کلینیک دندانپزشکی بارانا مشهد می‌توانید همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل با شماره‌های ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

سوالات متداول در مورد عصب کشی دندان شیری

۱ .ایا عصب کشی دندان کودک درد دارد ؟

عصب کشی دندان کودکان درد دارد اما با استفاده از بی‌حسی موضعی قابل تحمل خواهدبود. در صورت اضطراب یا عدم همکاری کودک، می‌توان از آرام‌بخش خفیف مثل گاز خنده استفاده کرد. در موارد نادر نیز ممکن است عصب کشی دندان کودکان با بیهوشی انجام شود.

۲ .آیا درمان ریشه کودکان به دندان دائمی آسیب می‌زند؟

خیر، اگر روند درمان عصب کشی و روکش دندان کودکان ، اصولی انجام شود، دندان دائمی زیرین آسیبی ندیده و باقی ماندن دندان شیری به رشد طبیعی دندان دائمی کمک خواهدکرد.

۳ .آیا مراحل عصب کشی دندان برای کودکان مانند بزرگ‌سالان است؟

خیر، مراحل عصب کشی دندان شیری اطفال معمولاً ساده‌تر است. در دندان‌های شیری از روش ساده‌تر پالپوتومی و مواد قابل جذب استفاده می‌شود؛ در حالی که در دندان‌های دائمی، کل پالپ خارج شده و با مواد دائمی پر می‌شود. هدف از این درمان، حفظ موقت دندان شیری تا زمان رویش دندان دائمی است.