

دندانپزشکی کودکان در مشهد | لیست قیمت 1405 + نمونه کار



آنچه در این مقاله می‌خوانید:

بارانا، بهترین کلینیک دندانپزشکی کودکان مشهد، تمامی خدمات دندانپزشکی اطفال را به متقاضیان ارائه می‌دهد. این خدمات شامل کشیدن، ترمیم، روکش دندان، فلورایدتراپی و ساخت فضا نگهدار می‌شود. هزینه خدمات ویژه اطفال با بهترین دندانپزشک کودکان در مشهد بین 2,000,000 تا 4,500,000 تومان است.

هزینه خدمات کلینیک دندانپزشکی کودکان مشهد (مجموعه بارانا - 1405)

آخرین به‌روزرسانی: تیر ۱۴۰۵

هزینه دندانپزشکی اطفال در مشهد باتوجه به نوع مشکل بیمار، نوع بیمه و کلینیک دندانپزشکی، متفاوت است. در ادامه، قیمت هر یک از خدمات بخش اطفال در کلینیک دندانپزشکی بارانا آورده شده‌است.

نوع درمان	قیمت (تومان)
پالپتومی (توضیح زیر جدول)	2,000,000
ترمیم دندان	2,000,000 تا 4,500,000

نوع درمان	قیمت (تومان)
روکش استیل	3,500,000
فضانگهدار	5,000,000
فلورایدتراپی	1,300,000
کشیدن دندان	800,000

پالپتومی: درمانی برای دندان شیری که پوسیدگی عمیق داشته و عصب آن آسیب دیده است. در این روش قسمت آسیب دیده برداشته شده و باقی دندان می ماند تا به طور طبیعی بیفتد. این کار درد را کاهش می دهد و از عفونت جلوگیری می کند.

در کلینیک دندانپزشکی بارانا ارائه خدمات کودکان با بی هوشی انجام نمی شود.

برخی از نمونه کارهای بارانا، کلینیک دندانپزشکی اطفال مشهد



چرا بارانا خدمات دندانپزشکی کودکان با بیهوشی در مشهد را ارائه نمی‌دهد؟ در کادر پزشکی بارانا، متخصص دندانپزشکی کودکان در مشهد با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی کودک و مدیریت رفتاری (Tell-Show-Do)، تمامی اقدامات درمانی مورد نیاز هر کودک را بدون نیاز به بیهوشی عمومی و با همکاری داوطلبانه خود کودک انجام می‌دهد.

متخصص دندانپزشک کودکان خوب در مشهد



دکتر «مارال فیضی» یکی از معدود دندانپزشکانی است که لقب بهترین دندانپزشک اطفال در مشهد را به خود اختصاص داده است. دکتر فیضی با تسلط بر متدهای جدید دندانپزشکی اطفال، تمرکز خود را بر حفظ حداکثری دندان‌های شیری و جلوگیری از آسیب به جوانه دندان‌های دائمی معطوف کرده‌اند. ایشان با استفاده از متدهای مدیریت رفتاری، ترس کودکان را به همکاری داوطلبانه تبدیل می‌کنند. به همین واسطه کلینیک بارانا یکی از بهترین مراکز دندانپزشکی اطفال در مشهد شناخته می‌شود.

برای رزرو نوبت معاینه و مشاوره دندانپزشکی کودکان، با شماره‌های [۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹](tel:05137609009) یا [۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹](tel:09157609009) تماس بگیرید.

بهترین دندانپزشکی کودکان مشهد شبانه روزی کجاست؟

با جستجوی عبارت دندانپزشکی کودکان مشهد، نام کلینیک‌ها و دندانپزشکان مختلف حوزه دندان پزشکی کودکان مشهد به شما نمایش داده می‌شود؛ اما هیچ کدام به صورت شبانه روزی فعالیت ندارند. در صورت بروز مشکل دندانپزشکی برای کودک در ساعات شب، معمولاً باید از راهکارهای موقت برای کنترل شرایط استفاده کرده و در اولین زمان ممکن به کلینیک مراجعه کنید.



لبخند مراجعه‌کننده کلینیک دندانپزشکی کودکان بارانا

در صورت بروز مشکل دندانپزشکی در شب چه کار کنیم؟

شستشوی دهان با آب ولرم یا استفاده از کمپرس سرد (روی گونه)، دندان درد ناشی از التهاب را تسکین می‌دهد. همچنین می‌توانید با مشورت دندانپزشک اطفال مشهد، از مسکن‌های دارویی استفاده کنید.

هرگز بدون مشورت با متخصص دندانپزشک کودکان خوب در مشهد، به کودک داروهای آنتی‌بیوتیک یا مسکن‌های مخصوص بزرگسالان ندهید.

دندانپزشکی اطفال ارزان در مشهد

چنانچه به دنبال دندانپزشکی اطفال ارزان در مشهد هستید، در نظر داشته باشید که انتخاب بر اساس قیمت می‌تواند ریسک‌های جدی به همراه داشته باشد. دندان‌های شیری نقشی حیاتی در تکلم، جویدن و حفظ فضای دندان‌های دائمی دارند، بنابراین پوسیدگی یا از دست رفتن زودرس آن‌ها عواقب طولانی‌مدتی به همراه خواهد داشت.

دکتر دندانپزشک کودکان مشهد علاوه بر مهارت فنی، باید توانایی برقراری ارتباط مؤثر با کودک را داشته باشد تا ترس و اضطراب او را کاهش داده و تجربه‌ای مثبت بسازد. این تعامل، کودک را به رعایت بهداشت دهان و دندان در آینده تشویق می‌کند.

بارانا، کلینیک دندان پزشکی کودکان مشهد با تخصیص بخشی مجزا به کودکان، محیطی دوستانه و سرگرم‌کننده فراهم کرده است. ما با تیمی از متخصصین مجرب و استفاده از تجهیزات به‌روز، خدمات جامع پیشگیرانه و درمانی را ارائه می‌دهیم. هدف ما ارائه خدماتی با کیفیت بالا و قیمتی منصفانه است تا سلامت دندان فرزندان شما هرگز فدای هزینه نشود.

پیشگیری از پوسیدگی های دندان

شایع‌ترین بیماری دهان و دندان کودکان، پوسیدگی دندان است. برای جلوگیری از این بیماری، مراقبت‌ها و آموزش‌های زیر ضروری است:

1. مدیریت رژیم غذایی کودکان

خوراکی‌های چسبنده و شیرین مثل گز و سوهان، خطر پوسیدگی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند. به همین دلیل، متخصص دندانپزشکی کودکان در مشهد توصیه می‌کنند والدین مصرف این مواد را برای کودکان محدود کنند. از آنجا که تعداد دفعات خوردن شیرینی مهم‌تر از میزان آن است، بهتر است برای تنظیم یک برنامه غذایی سالم با دندانپزشک کودک مشورت شود.

تأکید کارشناسان IAPD بر نقش کلیدی مشاوره تغذیه

انجمن بین‌المللی دندانپزشکی کودکان (IAPD) در توصیه‌های بالینی خود، مراقبت پیشگیرانه را پایه اصلی حفظ سلامت دهان و دندان در کودکان می‌داند. یکی از مواردی که این انجمن بر آن تأکید ویژه دارد، مشاوره تغذیه به‌ویژه در زمینه کاهش مصرف قند است. طبق نظر کارشناسان IAPD کاهش مصرف قند از مؤثرترین اقدامات برای کاهش خطر پوسیدگی دندان کودکان محسوب می‌شود.

2. آموزش استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان به کودک

دومین قدم در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های شیری، آموزش نحوه صحیح استفاده از مسواک و نخ دندان به کودک است. دندانپزشک اطفال مشهد در جلسه مراجعه، به والدین و کودک نحوه صحیح استفاده از مسواک و نخ دندان را آموزش

می‌دهد. توجه داشته باشید که مسواک‌زدن باید 2 دقیقه طول بکشد؛ برای ترغیب کودک می‌توانید از تایمرهای عروسکی استفاده کنید.

3. فلوراید تراپی کودکان

فلوراید تراپی یکی از روش‌های کم‌هزینه، راحت و بدون درد برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان است. بهتر است فلوراید تراپی از 3 سالگی که رویش دندان‌های شیری کامل می‌شود تا 14 سالگی که 2 سال از رویش دندان آسیا دوم دائمی می‌گذرد، هر 6 ماه یکبار انجام شود.



آغاز مسواک زدن با رویش اولین دندان

در صورتی که فلوراید تراپی در مطب و توسط بهترین دندانپزشک اطفال انجام شود، هیچ عارضه‌ای نداشته و باعث افزایش مقاومت دندان‌های کودکان در برابر پوسیدگی می‌شود.

4. فیشور سیلانت کودکان

در فیشور سیلانت (پوشاندن شیارهای دندان) به منظور جلوگیری از پوسیدگی، یک لایه محافظ و هم‌رنگ دندان روی شیارهای عمیق سطح دندان آسیا قرار می‌گیرد. در صورت پر نکردن این شیارها، مواد خوراکی به دندان می‌چسبند و با مسواک هم به خوبی تمیز نمی‌شوند؛ در نتیجه دندان‌ها دچار پوسیدگی می‌شوند.



پر کردن شیارهای دندان آسیا برای پیشگیری از پوسیدگی

پر کردن و عصب کشی دندان شیری

«پوسیدگی» اصلی ترین عامل دندان درد کودکان بوده و «پر کردن» یا «عصب کشی»، رایج ترین درمان برای آن است. درد، التهاب و عفونت از عواقب عدم درمان دندان شیری پوسیده است که ممکن است از انتهای ریشه به لثه نفوذ کرده و منجر به آسیب دندان دائمی شود. در صورتی که پوسیدگی دندان کودک سطحی باشد، از ترمیم و چنانچه پوسیدگی به پالپ دندان شیری برسد، از عصب کشی برای درمان آن استفاده می شود.

باور غلط: دندان های شیری می افتند، پس نیازی به درمان ندارند!

دندان های شیری به حفظ فضای دندان های دائمی، صحبت کردن و غذا خوردن کمک می کنند. پوسیدگی دندان شیری می تواند باعث درد، عفونت و آسیب به دندان دائمی شود؛ بنابراین درمان و مراقبت از دندان های شیری به اندازه دندان های دائمی، ضروری است.

چنانچه تصمیم به درمان پوسیدگی دندان فرزند خود در بهترین کلینیک دندانپزشکی کودکان مشهد را دارید، با مجموعه بارانا به شماره 051-37609009 تماس بگیرید.



لبخند رضایت مهمان کوچک بارانا بعد از پر کردن دندان شیری

تفاوت دندانپزشک عمومی با متخصص دندانپزشکی اطفال مشهد

متخصص دندانپزشکی اطفال علاوه بر دوره دندانپزشکی عمومی، یک دوره تخصصی با موضوع روانشناسی کودکان را نیز فرا می گیرد. از این رو متخصص دندانپزشک کودکان خوب در مشهد به خوبی می تواند در کمترین زمان ممکن اعتماد کودکان را جلب کرده و ترس و استرس آن ها را به حداقل برساند. در ادامه ویدیویی از مراجعه کودک به کلینیک بارانا را مشاهده خواهید کرد.

شکست درمان دندان کودکان (درمان خوب کافی نیست!)

حتی در صورت مراجعه به بهترین دندانپزشک اطفال مشهد، برقراری ارتباط مناسب با کودک و ارائه خدمات با کیفیت، گاهی نتیجه درمان با شکست مواجه می شود. دلیل اصلی این موضوع، مسواک نزدن منظم یا مصرف زیاد شیرینی جات است. این موضوع می تواند پوسیدگی های مکرر را به دنبال داشته باشد.

آیا والدین می توانند در اتاق درمان همراه کودک خود حضور داشته باشند؟

پس از مراجعه به کلینیک دندانپزشکی کودکان مشهد، بهتر است کودک بدون حضور والدین وارد اتاق درمان شود. تحقیقات روانشناسی در حوزه دندانپزشکی اطفال نشان می دهد که جدایی موقت در زمان درمان، چند مزیت کلیدی دارد که عبارتند از:

- وقتی والدین همراه کودک نباشند، او تمام تمرکز خود را روی صحبت های دندانپزشک می گذارد و زودتر به او اعتماد می کند.
 - حضور والدین معمولاً باعث تحریک واکنش های احساسی (مثل گریه برای جلب توجه) می شود. در غیاب والدین، کودکان اغلب شجاعت بیشتری از خود نشان می دهند و همکاری بهتری دارند.
 - فضای خلوت تر در اتاق درمان، تمرکز متخصص دندانپزشکی کودکان مشهد را به حداکثر می رساند و در نتیجه پروسه موردنظر سریع تر و باکیفیت تر انجام خواهد شد.
- در ویدیوی زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه کودک در محیط درمان، بدون ترس و با همکاری مناسب، مراحل درمان را طی می کند.

متخصص دندانپزشکی کودکان مشهد در کلینیک بارانا از طریق بازی کردن با کودک، هدیه دادن و ارتباط کلامی صمیمانه، حس ناامنی را از او دور می کند. در ویدیوی زیر، کودکی را مشاهده می کنید که بدون نگرانی، پروسه درمان را طی می کند:

سؤالات متداول درباره دندانپزشکی کودکان

بهترین مرکز دندانپزشکی کودکان مشهد شبانه روزی کدام است؟

بهترین سن برای مراجعه به دندانپزشک اطفال چه سنی است؟

مسواک مناسب برای کودکان چه ویژگی هایی دارد؟

چرا دندان شیری به عصب کشی نیاز دارد؟

دندان شیری از چند سالگی میفته؟

آیا جویدن آدامس برای کودکان مضر است؟

چرا با وجود مسواک زدن منظم، دندان های فرزندم باز هم دچار پوسیدگی می شود؟

چه عاداتی در کودکان برای دندان ها مشکل ساز می شود؟

از جمله عاداتی که برای دندان کودکان مشکل ساز می شوند عبارتند از:

- دندان قروچه
- تنفس دهانی در خواب
- فشردن زبان بین دندان ها
- استفاده ابزاری از دندان ها
- مکیدن انگشتان دست و پستانک از سه سالگی به بعد

آیا مصرف شیر در پوسیدگی دندان شیری تاثیر دارد؟

بله، معمولاً قند موجود در شیری که نوزاد هنگام خواب می خورد می تواند منجر به پوسیدگی زودرس دندان های شیری (Baby Bottle Tooth Decay) شود. با تمیز کردن لثه و دهان در دوران نوزادی کودک خود می توانید از مراجعه به دندانپزشکی کودکان در آینده پیشگیری کنید.

سایت [nationwidechildrens](http://nationwidechildrens.org) در پاسخ به این سوال گفته است که:

تمام انواع شیر در صورت مصرف نامناسب می توانند باعث ایجاد پوسیدگی شوند.

علائم پوسیدگی دندان کودکان

1. **تغییر رنگ دندان ها:** تغییر رنگ دندان ها از سفید به خاکستری و سپس قهوه ای مایل به سیاه نشانه پوسیدگی است.
 2. **حساسیت دمای:** تیر کشیدن و درد دندان هنگام خوردن غذاهای خیلی سرد یا گرم؛ همچنین خوردن خوراکی های ترش یا شیرین، یکی از نشانه های پوسیدگی دندان است.
 3. **بوی بد دهان همراه با درد دندان ها:** یکی از شایع ترین علائم پوسیدگی دندان ها، بد بو شدن دهان همراه با درد دندان ها است.
- بهتر است با مشاهده اولین نشانه های پوسیدگی دندان فرزندتان، به یک کلینیک معتبر دندانپزشکی کودکان مراجعه کنید تا از وقوع آسیب های بعدی جلوگیری کنید.



4 عامل مهم پوسیدگی دندان در کودکان

اصلی ترین دلایل تغییر رنگ دندان کودکان چیست؟

عواملی مانند سبک زندگی و برخی مشکلات ژنتیک می توانند از اصلی ترین دلایل تغییر رنگ دندان کودکان باشند. در ادامه به تمامی دلایل احتمالی ایجاد لکه و تغییر رنگ دندان ها در سنین پایین اشاره خواهیم کرد.



- مصرف بیش از حد قند
- زردی و یا یرقان در کودکان
- استفاده از قطره آهن در نوزادان
- استفاده از مواد غذایی حاوی انواع رنگدانه‌ها
- تمیز نشدن دندان‌ها به دلیل مسواک زدن نادرست
- ظهور نکروز دندان در اثر تروما (ضربه و شکستگی دندان)
- بیماری مربوط به نقص تشکیل مینای دندان (بیماری مادرزادی)
- مصرف برخی داروهای خاص توسط مادر در دوران بارداری مانند تتراسایکلین

هشدار مهم! از آنجا که تغییر رنگ دندان‌های کودک شما سن مشخصی ندارد؛ به محض مشاهده رویش اولین دندان، باید به توصیه‌های متخصص دندانپزشکی کودکان درباره رعایت بهداشت دهان و دندان وی، توجه کنید.

آنتی بیوتیک برای عفونت دندان کودکان

گاهی اوقات عفونت دندان کودکان منجر به آبسه می‌شود. در این شرایط دندانپزشک کودکان، آنتی‌بیوتیک تجویز می‌کند که از بهترین آن‌ها می‌توان به آموکسی سیلین، مترونیدازول و آزیترومایسین اشاره کرد. در نظر داشته باشید که بعد از اتمام داروها و بهبود آبسه بلافاصله جهت درمان عامل اصلی عفونت به دندانپزشکی کودکان مراجعه کنید.



مصرف آنتی‌بیوتیک برای عفونت لثه کودکان

مراقبت‌های حیاتی پس از عصب‌کشی دندان کودکان

حفظ دندان‌های شیری، مانع رویش نامنظم دندان‌های دائمی شده و فرزند شما را از انجام خدماتی نظیر ارتودنسی بی‌نیاز می‌کند؛ بنابراین در صورت نیاز دندان شیری به درمان، هرگز آن را به تعویق نیندازید. در ادامه به بررسی نکات مهم مراقبتی پس از درمان ریشه که متخصصین دندانپزشکی اطفال مشهد به آن‌ها تأکید فراوانی دارند، می‌پردازیم.

1. کنترل دندان درد کودک

احساس درد و سوزش پس از عصب‌کشی و درمان ریشه کاملاً طبیعی بوده و ظرف مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. بنا بر تجویز دندانپزشک اطفال مشهد می‌توانید برای کاهش درد فرزند خود از کمپرس سرد یا داروهای مسکن استفاده کنید؛ اما در صورت تداوم درد، حتماً به کلینیک دندانپزشکی کودکان در مشهد مراجعه کنید.



مدیریت دندان درد کودک با مسکن

2. توجه به بهداشت دهان و دندان کودک

استفاده از نخ دندان برای تمیز کردن دندان کودک و کمک به مسواک زدن صحیح دندان‌ها، مانع از آسیب دیدن و تحریک محل ترمیم می‌شود. با رسیدگی منظم به بهداشت دهان و دندان پس از درمان ریشه، می‌توان از حمله باکتری‌ها به دندان در حال بهبود جلوگیری کرد.

3. استراحت کافی کودک

برای جلوگیری از خونریزی دندان بهتر است کودک از فعالیت‌های شدید مانند دویدن که منجر به افزایش جریان خون در محل درمان می‌شود، پرهیز کند.

توجه: چنانچه با رعایت هر یک از مراقبت‌های پس از درمان ریشه، کودک شما باز هم احساس نارضایتی یا درد در محل درمان داشت، ممکن است که به عفونت دندان مبتلا شده باشد. این عفونت معمولاً با علائمی مانند تب، درد شدید و یا تورم لثه همراه است که بلافاصله پس از ملاحظه هر یک از این موارد باید به کلینیک دندان پزشکی کودکان در مشهد مراجعه کنید.

سفید کردن دندان کودکان با بلیچینگ

بلیچینگ یکی از راه‌های رفع لکه‌های دندان‌هاست؛ اما دندانپزشکان اطفال انجام آن را قبل از ۱۸ سالگی توصیه نمی‌کنند. در صورت نیاز به درمان در اواخر دوران نوجوانی، ابتدا تری سفیدکننده ساخته شده و سپس دندان‌ها با محلول هیدروژن پراکساید کم‌غلظت سفید می‌شوند تا به مینای دندان آسیبی نرسد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله [بلیچینگ دندان کودکان](#) را مطالعه کنید.

جرم گیری دندان کودکان

سلامت دندان‌های دائمی به حفظ سلامت دندان‌های شیری وابسته است، پس برای داشتن دندان‌هایی سالم و مستحکم باید رعایت بهداشت دندان‌های شیری را جدی گرفت. بسیاری از کودکان به خوبی نمی‌توانند دندان‌ها را به کمک مسواک و نخ دندان تمیز کنند و این موضوع باعث تشکیل جرم و پلاک روی دندان‌های شیری می‌شود. در این شرایط متخصص دندانپزشک کودکان در

مشهد جرم‌گیری را توصیه می‌کند. در صورتی که جرم‌گیری به موقع انجام نشود، می‌تواند عواقبی در پی داشته باشد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

- پوسیدگی
- بد بو شدن دهان کودک
- زرد شدن و ایجاد لکه بر روی دندان‌ها
- از دست دادن دندان‌های شیری و دائمی
- افزایش احتمال نیاز به درمان‌های مختلف دندانپزشکی مانند عصب‌کشی

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله جرم‌گیری دندان کودک را بخوانید.

نکات مهم درباره ارتودنسی کودکان

لازم به ذکر است که اولین چکاپ و ارزیابی دندان‌ها برای ارتودنسی باید در سن 7 سالگی انجام شود تا هر گونه مشکل در فک و دندان‌ها از همان ابتدا توسط متخصص دندانپزشکی کودکان در مشهد تحت معالجه قرار گیرد. عموماً درمان ارتودنسی در دختران از 8 سالگی و در پسران از 9 سالگی آغاز می‌شود. چنانچه ناهنجاری‌های فک و دندان‌ها شدید باشد، زودتر از زمان تعیین شده نیز می‌توان برای درمان اقدام کرد.

برای بررسی شرایط، صفحه ارتودنسی در مشهد را مطالعه کنید.

اطلاعات این صفحه صرفاً برای آگاهی والدین عزیز جمع‌آوری شده و جایگزین معاینه حضوری نمی‌شود. ساختار دندان‌های شیری بسیار حساس بوده و تصمیم‌گیری برای درمان آن، باید پس از بررسی دقیق توسط دندانپزشک اطفال انجام شود.